کتابخانه‌ی دکتر مکس · جلد ۹۲

# پاهای بی‌قرار

سندرم پاهای بی‌قرار بعد از ۵۰: چرا شب‌ها پاها آروم نمی‌گیرن، آهن و فریتین، داروهایی که بدترش می‌کنن، ورزش و کشش، خواب بهتر، و برنامه‌ی ۱۲ هفته‌ای، با ۷۹ تمرین تصویری



دکتر مکس زینلی · فیزیوتراپیست

MAXACADEMY

# با دکتر مکس همراه باش

ویدیوی تمرین‌ها، تحقیقات تازه و پاسخ سؤال‌هات رو در کانال‌های دکتر مکس دنبال کن. برای باز شدن هر کانال، روی آدرسش بزن:

| کانال | آدرس |
| --- | --- |
| اینستاگرام | instagram.com/dr.max.zeinali |
| کانال پخش اینستاگرام | عضویت در کانال |
| یوتیوب | youtube.com/@dr.max.zeinali |
| تلگرام | t.me/drmaxzeinalibook |
| کانال واتساپ | عضویت در کانال |
| وبسایت و تست‌های آنلاین | drmaxacademy.com |

## پیش از شروع بخوان

این کتاب آموزشیه و جایگزین **پزشک** تو نیست. **آهن** رو فقط طبق **آزمایش** و نظر پزشک بخور. هیچ **دارویی** (به‌خصوص داروهای دوپامینی، ضدافسردگی یا گاباپنتین) رو خودسرانه **قطع** یا **زیاد** نکن. **همون روز به پزشک**: **ورم، درد و گرمی ناگهانی یک ساق**؛ **ضعف** یا **بی‌حسی** پا؛ علائم با دارو **زودتر، شدیدتر** یا به **دست‌ها** رسیده؛ **بی‌خوابی** چند شب پشت سر هم. **فوراً ۱۱۵**: **تنگی نفس ناگهانی** یا **درد قفسه‌ی سینه**؛ علائم **سکته‌ی مغزی** (کج شدن صورت، ضعف یک طرف، اختلال گفتار). اگه **غم شدید، بی‌امیدی** یا **فکر آسیب به خودت** داری، همین امروز با **صدای مشاور بهزیستی ۱۴۸۰** یا پزشک تماس بگیر؛ در خطر فوری، **۱۱۵**.

© دکتر مکس زینلی · MAXACADEMY · همه‌ی حقوق محفوظ است.
هرگونه کپی، انتشار یا فروش این کتاب بدون اجازه‌ی کتبی ممنوعه.

تصاویر افراد این کتاب با کمک هوش مصنوعی ساخته شده و از نظر درستی حرکت، توسط فیزیوتراپیست بازبینی شده‌اند.

# فهرست


**بخش ۱: پاهای بی‌قرار** ۹

۱. پاهای بی‌قرار چیه؟ ۱۰

۲. علت‌ها ۱۰

۳. داروها و عادت‌هایی که بدترش می‌کنن ۱۱

۴. درمان‌ها ۱۲

۵. علائم خطر و اشتباه‌های رایج ۱۳

۶. باورهای غلط ۱۴

**بخش ۲: شواهد** ۱۶

۷. کارآزمایی ورزش ۱۷

۸. رهنمود AASM (۲۰۲۵) ۱۷

۹. آهن و فریتین ۱۸

۱۰. بدتر شدن با داروهای دوپامینی ۱۹

**بخش ۳: تمرین** ۲۱

۱۱. روتین عصر ۲۲

۱۲. هوازی ۲۲

۱۳. قدرت پا ۲۳

۱۴. کشش ۲۴
۱۵. وسط حمله ۲۵
۱۶. تعادل ۲۶
۱۷. قانون علائم و زمان اثر ۲۷

**بخش ۴: زندگی روزمره ۲۹**

۱۸. شب و خواب ۳۰
۱۹. قهوه، چای، الکل و سیگار ۳۰
۲۰. نشستن طولانی ۳۱
۲۱. گرما و سرما ۳۲
۲۲. غذا و آهن ۳۳
۲۳. کلیه و دیابت ۳۴

**بخش ۵: برنامه‌ی ۱۲ هفته‌ای ۳۶**

۲۴. چطور تمرین کنم: مقدار، شدت و پیشرفت ۳۷
۲۵. فاز ۱: شروع و آزمایش آهن (هفته‌ی ۱ تا ۳) ۳۹
۲۶. فاز ۲: قدرت پا (هفته‌ی ۴ تا ۸) ۴۰
۲۷. فاز ۳: هوازی بیشتر (هفته‌ی ۹ تا ۱۲) ۴۱
۲۸. فاز ۴: همیشگی (ماه ۴ به بعد) ۴۲
۲۹. برنامه‌ی ۱۰ دقیقه‌ای ۴۳

۳۰. برنامه‌ی نگهداری مادام‌العمر و برنامه‌ی پیاده‌روی ۴۴

۳۱. شب‌های بد ۴۷

**بخش ۶: کتابخونه‌ی تمرین‌ها ۴۹**

**بخش ۷: خانواده، زندگی و داستان‌ها ۱۲۹**

۳۲. خانواده ۱۳۰

۳۳. کار ۱۳۰

۳۴. خونه ۱۳۱

۳۵. داستان ثریا خانم: فریتین پایین ۱۳۲

۳۶. داستان آقای حسینی: دارو بیشتر، علائم بیشتر ۱۳۳

۳۷. داستان لیلا خانم: قرص سرماخوردگی شبانه ۱۳۴

**بخش ۸: پرسش‌ها، جدول‌ها و واژه‌نامه ۱۳۶**

۳۸. ۵۰ سؤال رایج ۱۳۷

۳۹. جدول‌های پیگیری ۱۴۴

۴۰. واژه‌نامه ۱۴۹

**منابع علمی ۱۵۰**

# پیش‌گفتار

«شب که دراز می‌کشم، پاهام انگار مورچه داره.» «مجبورم بلند شم راه برم تا آروم بشه.» «همه می‌گن عصبیه.»

**سندرم پاهای بی‌قرار** یک بیماری **عصبی** واقعیه، نه «عصبی بودن». یک **میل شدید به تکون دادن پاها** که با **استراحت** و **عصر و شب** بدتر می‌شه و با **حرکت** موقتاً آروم می‌گیره. در **زن‌ها** و با **سن** شایع‌تره و خواب رو خراب می‌کنه.

پیام اصلی این کتاب: سه چیز خیلی کمک می‌کنه:

- **آهن**: کمبود آهن (حتی وقتی کم‌خونی نداری) یکی از مهم‌ترین علت‌های قابل درمانه.
- **دارو و عادت**: بعضی داروها، الکل و کافئین بدترش می‌کنن.
- **ورزش منظم**: در یک کارآزمایی، **۱۲ هفته** ورزش هوازی و قدرت پا، **۳ بار در هفته**، علائم رو به‌طور معنی‌دار کم کرد.

رهنمود جدید **آکادمی پزشکی خواب آمریکا** (۲۰۲۵) هم درمان **آهن** رو در اولویت گذاشت و استفاده‌ی طولانی از داروهای **دوپامینی** رو برای بیشتر بیماران توصیه **نمی‌کنه**.

- **بخش ۱** بیماری، علت‌ها، داروها و عادت‌ها، درمان‌ها، علائم خطر، باورهای غلط.

- **بخش ۲** شواهد: ورزش، رهنمود AASM، آهن، و بدتر شدن با داروهای دوپامینی.
- **بخش ۳** تمرین: گرم کردن عصر، هوازی، قدرت، کشش، وسط حمله، تعادل، قانون علائم.
- **بخش ۴** زندگی روزمره: شب و خواب، نوشیدنی‌ها، نشستن طولانی، گرما و سرما، غذا و آهن، کلیه و دیابت.
- **بخش ۵** برنامه‌ی ۱۲ هفته‌ای.
- **بخش ۶** کتابخونه‌ی تصویری تمرین‌ها.
- **بخش ۷** خانواده، کار، خونه، و داستان‌ها.
- **بخش ۸** جواب سؤال‌های رایج، جدول‌ها و واژه‌نامه.

**دکتر مکس زینلی**

فیزیوتراپیست

بخش ۱

# پاهای بی‌قرار

بیماری چیه، علت‌ها، داروها و عادت‌هایی که بدترش می‌کنن، درمان‌ها، علائم خطر و اشتباه‌های رایج، و باورهای غلط.

فصل ۱

# پاهای بی‌قرار چیه؟

## چهار نشونه‌ی اصلی

| ☐ | |
|---|---|
| | **میل شدید** به تکون دادن پاها، معمولاً با یک حس **ناخوشایند** (مورچه، کشیدگی، جریان برق، خارش داخل پا) |
| | با **استراحت**، نشستن یا دراز کشیدن **شروع یا بدتر** می‌شه |
| | با **حرکت** (راه رفتن، کشش) **موقتاً بهتر** می‌شه |
| | **عصر** و **شب** بدتره |

**نکته‌ی دکتر مکس**

اگه هر چهار نشونه رو داری و علت دیگه‌ای (مثل گرفتگی عضله) نیست، احتمال پاهای بی‌قرار زیاده. تشخیص با **پزشکه**.

**میل به تکون دادن، بدتر در استراحت و شب.**

فصل ۲

# علت‌ها

| | |
|---|---|
| **کمبود آهن** | مهم‌ترین علت قابل درمان؛ حتی **بدون کم‌خونی** |
| **سابقه‌ی خانوادگی** | |
| **بیماری کلیه** و **دیالیز** | |
| **نوروپاتی** (مثلاً در دیابت) | |
| **بارداری** | |
| **بیماری پارکینسون** | |

**نکته‌ی دکتر مکس**

در خیلی‌ها علت مشخصی پیدا نمی‌شه؛ ولی **آهن** رو همیشه باید بررسی کرد (فصل ۹).

**اول آهن رو چک کن.**

فصل ۳

# داروها و عادت‌هایی که بدترش می‌کنن

| | ممکنه بدترش کنن |
|---|---|
| | **آنتی‌هیستامین‌های** خواب‌آور (بعضی قرص‌های سرماخوردگی و حساسیت) |
| | بعضی **داروهای ضدافسردگی** |
| | بعضی **داروهای ضدتهوع** و **ضدروان‌پریشی** |
| | **الکل** |
| | **کافئین**: قهوه، چای پررنگ، نوشابه‌ی کولا |
| | **سیگار** |
| | **کم‌خوابی** |

هیچ دارویی رو **خودسرانه** قطع نکن؛ با پزشک درباره‌ی جایگزین صحبت کن.

**قرص سرماخوردگی شبانه؟ از پزشک بپرس.**

فصل ۴

# درمان‌ها

طبق رهنمود **AASM** (۲۰۲۵):

| درمان | |
|---|---|
| **آهن** (خوراکی یا تزریقی) | وقتی آزمایش آهن پایینه؛ آستانه برای این بیماری **بالاتر** از حد معمول |
| **گاباپنتین** و **پرگابالین** | داروهای **اصلی**؛ توصیه‌ی **قوی** |
| **داروهای دوپامینی** (پرامی‌پکسول، روپینیرول) | برای بیشتر بیماران **توصیه نمی‌شن** به‌خاطر خطر **بدتر شدن** در طول زمان (فصل ۱۰) |
| **تحریک عصب** پایین زانو با دستگاه | گزینه‌ی غیردارویی |
| **ورزش**، **کشش** و **خواب منظم** | پایه‌ی همه‌ی برنامه‌ها |

**آهن، دارو با پزشک، ورزش با تو.**

فصل ۵

# علائم خطر و اشتباه‌های رایج

## اشتباه نگیر

| | پاهای بی‌قرار | گرفتگی عضله | لخته | تنگی شریان پا |
|---|---|---|---|---|
| **حس** | میل به تکون دادن | سفت شدن **دردناک** ناگهانی | ورم و درد **یک** ساق | درد ساق با **راه رفتن** |
| **با حرکت** | **بهتر** | با کشش بهتر | | با **ایستادن** بهتر |

## همون روز به پزشک

| ☐ |
|---|
| **ورم**، **درد** و **گرمی** ناگهانی **یک** ساق |
| **ضعف** یا **بی‌حسی** پا |
| علائم با **داروی** دوپامینی **زودتر** شروع می‌شه یا به **دست‌ها** رسیده |
| **غم شدید** یا **فکر آسیب به خود** به‌خاطر بی‌خوابی |

**یک ساق ورم و درد؟ لخته رو رد کن.**

فصل ۶

# باورهای غلط

| باور | واقعیت |
| --- | --- |
| «**عصبیه**، تلقینه» | یک بیماری **عصبی** واقعیه |
| «آهنم **نرماله**، کم‌خونی ندارم» | آستانه‌ی آهن برای این بیماری **بالاتره**؛ **فریتین** رو چک کن |
| «**ورزش** بدترش می‌کنه» | ورزش **متوسط** منظم **کمک** می‌کنه (فصل ۷)؛ فقط شدید و دیروقت نه |
| «**قرص خواب** حلش می‌کنه» | بعضی قرص‌ها و آنتی‌هیستامین‌ها **بدترش** می‌کنن |
| «داروی دوپامینی **بیشتر** بخورم» | ممکنه بیماری رو **بدتر** کنه (فصل ۱۰) |

برنامه‌ی پیاده‌روی ← ص ۶۰ · کشش ساق ← ص ۹۶

**ورزش متوسط، دوست پاهای بی‌قرار.**

بخش ۲

# شواهد

کارآزمایی ورزش، رهنمود AASM، آهن و فریتین، و بدتر شدن با داروهای دوپامینی.

فصل ۷

# کارآزمایی ورزش

| پژوهش | یافته |
|---|---|
| **Aukerman و همکاران** (J Am Board Fam Med، ۲۰۰۶): ۴۱ نفر تصادفی شدن؛ ۲۸ نفر شروع کردن (میانگین سن **۵۴**)؛ ۲۳ نفر تا آخر موندن | **۱۲ هفته** ورزش هوازی و **قدرت پایین‌تنه، ۳ روز در هفته** |
| | شدت علائم در گروه ورزش **خیلی بیشتر** از گروه بدون ورزش کم شد |

**نکته‌ی دکتر مکس**

مطالعه **کوچیکه**، ولی ورزش ارزون، بی‌خطر و برای بقیه‌ی بدن هم مفیده.

برنامه‌ی پیاده‌روی ← ص ۶۰ · بلند شدن از صندلی ← ص ۶۴

**سه بار در هفته، دوازده هفته.**

# رهنمود AASM (۲۰۲۵)

رهنمود **آکادمی پزشکی خواب آمریکا** (Winkelman و همکاران، ۲۰۲۵):

| توصیه | قدرت |
|---|---|
| **آهن تزریقی** (فریک کربوکسی‌مالتوز) در کمبود آهن | **قوی** |
| **آهن خوراکی** (سولفات آهن) | مشروط |
| **گاباپنتین، پرگابالین** | **قوی** |
| **داروهای دوپامینی** | مشروط **علیه** استفاده در بیشتر بیماران |
| **تحریک عصب** پایین زانو | مشروط |

**نکته‌ی دکتر مکس**

«مشروط» یعنی برای بعضی‌ها مناسبه؛ تصمیم با **پزشکه**.

**آهن اول.**

فصل ۹

# آهن و فریتین

| ☐ | |
|---|---|
| | از پزشک بخواه **فریتین** و **درصد اشباع ترانسفرین** رو چک کنه |
| | آزمایش رو **صبح** و ناشتا بده؛ بعضی داروها روی نتیجه اثر دارن |
| | برای پاهای بی‌قرار، آستانه‌ی درمان آهن **بالاتر** از حد معمول کم‌خونیه |
| | آهن خوراکی رو با **ویتامین C** (آب‌پرتقال) بخور، نه با **چای** |
| | آهن رو **خودسرانه** نخور؛ زیادیش هم **ضرر** داره |

**نکته‌ی دکتر مکس**

اگه آزمایش آهن پایینه، پزشک علتش (مثلاً **خونریزی** از روده یا رژیم) رو هم بررسی می‌کنه.

**فریتین رو بپرس.**

فصل ۱۰

# بدتر شدن با داروهای دوپامینی

**تشدید** (به انگلیسی augmentation) یعنی با مصرف طولانی داروهای دوپامینی، بیماری کم‌کم **بدتر** می‌شه:

| نشونه | |
|---|---|
| علائم **زودتر** در روز شروع می‌شن | مثلاً از عصر به بعدازظهر |
| **شدیدتر** می‌شن | |
| به **دست‌ها** یا **تنه** می‌رسن | |
| با **دوز بیشتر** کوتاه‌مدت بهتر، بعد **بدتر** | |

اگه این نشونه‌ها رو داری، **دوز رو خودت بیشتر نکن** و دارو رو **یهو قطع نکن**؛ با پزشک برنامه‌ی تغییر دارو بریز.

**دارو بیشتر، علائم بیشتر؟ به پزشک بگو.**

بخش ۳

# تمرین

گرم کردن عصر، هوازی، قدرت پا، کشش، وسط حمله، تعادل، و قانون علائم.

فصل ۱۱

# روتین عصر

یک تا دو ساعت **قبل از خواب**:

| تمرین | مقدار |
|---|---|
| **پیاده‌روی آروم** | ۱۰ دقیقه |
| **کشش ساق** | ۲ × ۳۰ ثانیه هر پا |
| **کشش پشت ران** | ۲ × ۳۰ ثانیه |
| **کشش جلوی ران** | ۲ × ۳۰ ثانیه |
| **تنفس** آروم | ۳ دقیقه |

برنامه‌ی پیاده‌روی ← ص ۶۰ · کشش ساق ← ص ۹۶ · کشش پشت ران ← ص ۹۷ · کشش جلوی ران ← ص ۹۹ · تنفس شکمی ← ص ۵۰

**عصر کشش، شب آرامش.**

فصل ۱۲

# هوازی

| ورزش | مقدار |
|---|---|
| **پیاده‌روی** | ۳۰ دقیقه، ۳ تا ۵ روز |
| **دوچرخه‌ی ثابت** | |
| **ورزش در آب** | |

برنامه‌ی پیاده‌روی ← ص ۶۰ · دوچرخه‌ی ثابت ← ص ۶۱ · ورزش در آب ← ص ۶۳

**نکته‌ی دکتر مکس**

بهترین زمان: **صبح** یا **عصر زود**. ورزش **خیلی شدید** درست قبل از خواب گاهی علائم رو **بیشتر** می‌کنه.

**متوسط و منظم، نه شدید و دیروقت.**

فصل ۱۳

# قدرت پا

| تمرین | مقدار |
|---|---|
| بلند شدن از صندلی | ۳ × ۱۰ |
| پل باسن | ۳ × ۱۲ |
| بالا رفتن روی پنجه | ۳ × ۱۵ |
| بالا رفتن از پله | ۲ × ۸ |
| اسکوات کوتاه | ۲ × ۱۰ |
| دور کردن پا ایستاده | ۲ × ۱۲ |

بلند شدن از صندلی ← ص ۶۴ · پل باسن ← ص ۷۲ · بالا رفتن روی پنجه ← ص ۶۶ ·
بالا رفتن از پله ← ص ۷۳ · اسکوات کوتاه با تکیه ← ص ۶۵ ·
دور کردن پا با کش (ایستاده) ← ص ۶۸

**پاهای قوی، شب‌های آروم‌تر.**

فصل ۱۴

# کشش

| تمرین | مقدار |
|---|---|
| **کشش ساق** | ۳ × ۳۰ ثانیه |
| **کشش پشت ران** | ۳ × ۳۰ ثانیه |
| **کشش جلوی ران** | ۲ × ۳۰ ثانیه |
| **کشش خم‌کننده‌ی ران** | ۲ × ۳۰ ثانیه |
| **چرخش کمر درازکش** | ۵ بار |

کشش ساق ← ص ۹۶ · کشش پشت ران ← ص ۹۷ · کشش جلوی ران ← ص ۹۹ · کشش جلوی لگن ← ص ۹۸ · چرخش ملایم کمر درازکش ← ص ۱۰۶

**هر شب، پنج دقیقه کشش.**

فصل ۱۵

# وسط حمله

وقتی شب پاها **بی‌قرار** شدن:

| کار | |
|---|---|
| **بلند شو** و چند دقیقه **راه برو** | |
| **کشش ساق** کنار دیوار | |
| **ماساژ** ساق با دست | |
| **پمپ مچ پا** | |
| کار **ذهنی** سرگرم‌کننده: جدول، کتاب | |

برنامه‌ی پیاده‌روی ← ص ۶۰ · کشش ساق ← ص ۹۶ · پمپ مچ پا ← ص ۵۱

**نکته‌ی دکتر مکس**

برای بعضی‌ها **دوش ولرم**، **کیسه‌ی گرم** یا **کیسه‌ی سرد** روی ساق کمک می‌کنه؛ امتحان کن ببین کدوم برای تو بهتره.

**بی‌قرار شدی؟ بلند شو، کشش بده.**

فصل ۱۶

# تعادل

| تمرین | مقدار |
|---|---|
| **پاشنه‌به‌پنجه** | ۳ × ۲۰ ثانیه |
| **روی یک پا** | ۳ × ۱۰ ثانیه |
| **راه رفتن پاشنه‌به‌پنجه** | ۲ × ۱۰ قدم |

ایستادن پشت‌سرهم ← ص ۱۰۸ · ایستادن روی یک پا ← ص ۹۱ ·
راه رفتن پاشنه‌به‌پنجه ← ص ۹۲

نکته‌ی دکتر مکس

**کم‌خوابی** تعادل رو کم می‌کنه؛ شب‌ها که بلند می‌شی، **چراغ** رو روشن کن.

**شب‌ها چراغ روشن.**

فصل ۱۷

# قانون علائم و زمان اثر

## قانون علائم

| | |
|---|---|
| ورزش **متوسط** و صبح یا عصر زود | **درسته** |
| بعد از ورزش **شدید** همون شب بدتر شدی | دفعه‌ی بعد **سبک‌تر** یا **زودتر** |
| **ورم و درد** یک ساق | قطع؛ همون روز پزشک |

## زمان اثر

| زمان | معمولاً |
|---|---|
| **همون شب** | کشش و راه رفتن: آرامش **موقت** |
| **هفته‌ی ۶ تا ۱۲** | ورزش منظم: علائم **کمتر** (مثل کارآزمایی Aukerman) |
| **۲ تا ۳ ماه** | اگه آهن کم بوده، بعد از درمان آهن |

**دوازده هفته صبر کن.**

بخش ۴

# زندگی روزمره

شب و خواب، نوشیدنی‌ها و سیگار، نشستن طولانی، گرما و سرما، غذا و آهن، و کلیه و دیابت.

فصل ۱۸

# شب و خواب

| ☐ | |
|---|---|
| | ساعت خواب و بیداری **ثابت** |
| | اگه علائم **دیروقت** میان، کمی **دیرتر** بخواب و **دیرتر** بیدار شو، اگه ممکنه |
| | **کم‌خوابی** علائم رو بیشتر می‌کنه |
| | گوشی و تلویزیون **قبل از خواب** کمتر |
| | **روتین عصر** (فصل ۱۱) |

تنفس شکمی ← ص ۵۰ · کشش ساق ← ص ۹۶

**خواب منظم، پای آروم‌تر.**

فصل ۱۹

# قهوه، چای، الکل و سیگار

| ☐ | |
|---|---|
| | **قهوه** و **چای پررنگ** بعد از ظهر نه |
| | **نوشابه‌ی کولا** و **شکلات** زیاد شب نه |
| | **الکل** نه |
| | **سیگار** و **قلیون** نه |
| | یک هفته **بدون کافئین** امتحان کن و ببین چه فرقی می‌کنه |

**یک هفته بدون کافئین امتحان کن.**

فصل ۲۰

# نشستن طولانی

سینما، هواپیما، مهمونی، جلسه:

| ☐ | |
|---|---|
| | **صندلی کنار راهرو** |
| | **پمپ مچ پا** و **فشار دادن** عضله‌ی ساق |
| | هر **۳۰ تا ۶۰ دقیقه** بلند شو |
| | سفرها رو **صبح** بذار، نه شب |
| | **کار ذهنی** سرگرم‌کننده |

پمپ مچ پا ← ص ۵۱ · رژه در حالت نشسته ← ص ۵۲

**صندلی کنار راهرو.**

فصل ۲۱

# گرما و سرما

| | |
|---|---|
| **دوش ولرم** قبل از خواب | برای خیلی‌ها کمک می‌کنه |
| **کیسه‌ی گرم** یا **سرد** روی ساق | بسته به آدم فرق می‌کنه |
| **پتوی** سنگین روی پاها | گاهی بدترش می‌کنه |

**نکته‌ی دکتر مکس**

با **نوروپاتی** و **بی‌حسی** پا، کیسه‌ی گرم و سرد رو **با احتیاط**؛ ممکنه پوست بسوزه.

**امتحان کن ببین گرم یا سرد.**

فصل ۲۲

# غذا و آهن

| ☐ | |
|---|---|
| | منابع آهن: **گوشت قرمز** کم‌چرب، **مرغ**، **ماهی**، **عدس**، **لوبیا**، **اسفناج** |
| | آهن گیاهی رو با **ویتامین C** (لیمو، گوجه، فلفل دلمه) بخور |
| | **چای** رو **یک ساعت** بعد از غذا بخور، نه همراهش |
| | **مکمل آهن** فقط طبق **آزمایش** و پزشک |

**عدس با لیمو، چای یک ساعت بعد.**

فصل ۲۳

# کلیه و دیابت

| ☐ | |
|---|---|
| | در **بیماری کلیه** و **دیالیز** پاهای بی‌قرار **شایع‌تره**؛ با تیم دیالیز صحبت کن |
| | در **دیابت**، نوروپاتی گاهی شبیه پاهای بی‌قراره؛ پزشک فرقشون رو می‌ذاره |
| | **قند** و **کلیه** رو کنترل کن |
| | ورزش در هر دو **کمک** می‌کنه |

**کلیه یا دیابت داری؟ به پزشکت بگو.**

بخش ۵

# برنامه‌ی ۱۲ هفته‌ای

دوز تمرین، فاز ۱ (شروع و آزمایش آهن)، فاز ۲ (قدرت پا)، فاز ۳ (هوازی بیشتر)، فاز ۴ (همیشگی)، برنامه‌ی ۱۰ دقیقه‌ای، نگه‌داری، و شب‌های بد.

فصل ۲۴

# چطور تمرین کنم: مقدار، شدت و پیشرفت

تمرین مثل دارو، **دوز** داره. دوز کم اثری نداره و دوز بیش از حد درد رو شعله‌ور می‌کنه.

## اصطلاحات

| اصطلاح | یعنی |
|---|---|
| **تکرار** | هر بار انجام کامل حرکت |
| **ست** | یک دسته تکرار پشت‌سرهم |
| **۳ × ۱۰** | ۳ ست، هر ست ۱۰ تکرار |
| **استراحت بین ست‌ها** | معمولاً ۱ تا ۲ دقیقه |
| **ایزومتریک** | نگه داشتن انقباض بدون حرکت |

## چقدر سنگین؟ قانون «۲ تا ۳ تکرار در ذخیره»

در پایان هر ست، باید حس کنی که فقط ۲ تا ۳ تکرار دیگه با فرم درست می‌تونستی انجام بدی. با مقیاس سختی ۰ تا ۱۰، هدف تمرین‌های قدرتی **۶ تا ۸ از ۱۰** است.

| اگه در پایان ست... | یعنی |
|---|---|
| می‌تونستی ۵ تکرار یا بیشتر دیگه بزنی | خیلی سبکه؛ سخت‌ترش کن |
| ۲ تا ۳ تکرار دیگه می‌تونستی | **درسته** |
| فرمت به هم ریخت یا نتونستی تموم کنی | خیلی سنگینه؛ سبک‌ترش کن |

## چند بار در هفته؟

| نوع تمرین | دفعات |
|---|---|
| تمرین قدرتی | **۲ تا ۳ روز در هفته**، با یک روز استراحت بین جلسه‌ها |
| تحرک و کشش | روزانه |
| تعادل | ۳ روز در هفته یا بیشتر |
| هوازی (پیاده‌روی، دوچرخه، شنا) | بیشتر روزهای هفته؛ هدف ۱۵۰ دقیقه در هفته |

## چطور پیشرفت کنم؟

وقتی تمرینی رو **دو جلسه‌ی پشت‌سرهم** با درد سبز و با «۴ تکرار در ذخیره» یا بیشتر انجام دادی، وقت پیشرفته. **فقط یک چیز** رو در هر بار تغییر بده:

1. تکرار بیشتر
2. ست بیشتر

3. مقاومت بیشتر (وزنه، کش محکم‌تر)

4. دامنه‌ی بیشتر

5. سرعت آهسته‌تر در مرحله‌ی برگشت

6. تک‌پا یا تک‌دست

7. پایداری کمتر

## ساختار هر جلسه

| بخش | زمان | کار |
|---|---|---|
| گرم کردن | ۵ تا ۱۰ دقیقه | راه رفتن در خونه، دوچرخه‌ی ثابت، حرکت‌های تحرکی |
| تمرین‌های اصلی | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | طبق برنامه |
| تعادل | ۵ دقیقه | طبق برنامه |
| سرد کردن | ۵ دقیقه | کشش و تنفس |

**نکته‌ی دکتر مکس**

بهترین زمان تمرین، زمانیه که **واقعاً انجامش می‌دی**. یک زمان ثابت انتخاب کن و مثل قرار دکتر بهش پایبند باش.

# فاز ۱: شروع و آزمایش آهن (هفته‌ی ۱ تا ۳)

| کار | مقدار |
|---|---|
| **آزمایش آهن** و **فریتین** با پزشک | یک بار |
| **مرور داروها** با پزشک | یک بار |
| پیاده‌روی | ۲۰ دقیقه، ۳ روز |
| روتین عصر | هر شب |

برنامه‌ی پیاده‌روی ← ص ۶۰ · کشش ساق ← ص ۹۶ · کشش پشت ران ← ص ۹۷

**آزمایش، دارو، روتین عصر.**

# فاز ۲: قدرت پا (هفته‌ی ۴ تا ۸)

۳ روز در هفته، صبح یا عصر زود:

| تمرین | مقدار |
|---|---|
| بلند شدن از صندلی | ۳ × ۱۰ |
| پل باسن | ۳ × ۱۲ |
| بالا رفتن روی پنجه | ۳ × ۱۵ |
| بالا رفتن از پله | ۲ × ۸ |
| پیاده‌روی | ۳۰ دقیقه |

بلند شدن از صندلی ← ص ۶۴ · پل باسن ← ص ۷۲ · بالا رفتن روی پنجه ← ص ۶۶ · بالا رفتن از پله ← ص ۷۳ · برنامه‌ی پیاده‌روی ← ص ۶۰

**سه روز در هفته، مثل کارآزمایی.**

# فاز ۳: هوازی بیشتر (هفته‌ی ۹ تا ۱۲)

| تمرین | مقدار |
|---|---|
| پیاده‌روی یا دوچرخه | ۳۰ دقیقه، ۵ روز |
| اسکوات کوتاه | ۳ × ۱۰ |
| دور کردن پا ایستاده | ۲ × ۱۲ |
| پاشنه‌به‌پنجه | ۳ × ۲۰ ثانیه |

دوچرخه‌ی ثابت ← ص ۶۱ · اسکوات کوتاه با تکیه ← ص ۶۵ · دور کردن پا با کش (ایستاده) ← ص ۶۸ · ایستادن پشت‌سرهم ← ص ۱۰۸

**منظم، متوسط، صبح یا عصر زود.**

فصل ۲۸

# فاز ۴: همیشگی (ماه ۴ به بعد)

| بخش | |
|---|---|
| ورزش | ۳ تا ۵ روز در هفته |
| روتین عصر | هر شب |
| آزمایش آهن | طبق پزشک |
| کافئین و الکل | کم یا هیچ |

برنامه‌ی پیاده‌روی ← ص ۶۰ · کشش ساق ← ص ۹۶ · بلند شدن از صندلی ← ص ۶۴

**روتین همیشگی.**

فصل ۲۹

# برنامه‌ی ۱۰ دقیقه‌ای

برای شب‌هایی که وقت نداری:

| تمرین | مدت |
|---|---|
| رژه ایستاده | ۲ دقیقه |
| کشش ساق | ۲ دقیقه |
| کشش پشت ران | ۲ دقیقه |
| کشش جلوی ران | ۲ دقیقه |
| تنفس | ۲ دقیقه |

رژه‌ی ایستاده با تکیه ← ص ۵۹ · کشش ساق ← ص ۹۶ · کشش پشت ران ← ص ۹۷ · کشش جلوی ران ← ص ۹۹ · تنفس شکمی ← ص ۵۰

**ده دقیقه قبل از خواب.**

فصل ۳۰

# برنامه‌ی نگهداری مادام‌العمر و برنامه‌ی پیاده‌روی

۱۲ هفته تموم شد. حالا چی؟ اثر تمرین با قطعش کم‌کم از بین می‌ره؛ ولی برای نگه داشتن، به اندازه‌ی ساختن وقت لازم نیست.

## برنامه‌ی نگهداری

| بخش | مقدار |
|---|---|
| تمرین قدرتی | **۲ جلسه در هفته**، ۶ تا ۸ تمرین از سطح فعلی‌ات |
| پیاده‌روی یا هوازی | ۱۵۰ دقیقه در هفته |
| تعادل | چند دقیقه در روز |
| تحرک و کشش | چند بار در هفته |
| تست‌ها | هر ۳ ماه |

## برنامه‌ی پیاده‌روی ۱۲ هفته‌ای

شدت طوری باشه که بتونی **حرف بزنی ولی آواز خوندن سخت باشه**.

| هفته | هر نوبت | روز در هفته | جمع هفتگی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ دقیقه | ۳ | ۳۰ دقیقه |

| هفته | هر نوبت | روز در هفته | جمع هفتگی |
|---|---|---|---|
| ۲ | ۱۰ دقیقه | ۴ | ۴۰ دقیقه |
| ۳ | ۱۵ دقیقه | ۴ | ۶۰ دقیقه |
| ۴ | ۱۵ دقیقه | ۵ | ۷۵ دقیقه |
| ۵ | ۲۰ دقیقه | ۴ | ۸۰ دقیقه |
| ۶ | ۲۰ دقیقه | ۵ | ۱۰۰ دقیقه |
| ۷ | ۲۵ دقیقه | ۴ | ۱۰۰ دقیقه |
| ۸ | ۲۵ دقیقه | ۵ | ۱۲۵ دقیقه |
| ۹ | ۳۰ دقیقه | ۴ | ۱۲۰ دقیقه |
| ۱۰ | ۳۰ دقیقه | ۵ | ۱۵۰ دقیقه |
| ۱۱ | ۳۰ دقیقه با بخش‌های تندتر | ۵ | ۱۵۰ دقیقه |
| ۱۲ | ۳۰ تا ۴۰ دقیقه | ۵ | ۱۵۰ تا ۲۰۰ دقیقه |

اگه درد بیشتر شد، **یک هفته به عقب برگرد**. می‌تونی نوبت‌ها رو تقسیم کنی (مثلاً ۳ نوبت ۱۰ دقیقه‌ای).

## گزینه‌های هوازی دیگه

| فعالیت | مزیت |
|---|---|
| دوچرخه‌ی ثابت | فشار کم، در خونه |

| فعالیت | مزیت |
| --- | --- |
| ورزش در آب | وزن کمتر روی مفاصل |
| تای‌چی | تعادل، قدرت و آرامش |
| رقص ملایم | لذت‌بخش و اجتماعی |

**نکته‌ی دکتر مکس**

پیاده‌روی رو اجتماعی کن: با همسر، دوست یا همسایه. کسانی که با هم تمرین می‌کنن، احتمال بیشتری داره که ادامه بدن.

فصل ۳۱

# شب‌های بد

| وضعیت | چی کار کنم |
|---|---|
| **بی‌قراری** شدید | بلند شو، راه برو، کشش، کار ذهنی |
| بعد از **سفر** یا **مهمونی** | روز بعد ورزش متوسط، شب روتین عصر |
| **بی‌خوابی** پشت سر هم | با پزشک صحبت کن |
| علائم **زودتر** و **شدیدتر** با دارو | به پزشک بگو (فصل ۱۰) |

برنامه‌ی پیاده‌روی ← ص ۶۰ · پمپ مچ پا ← ص ۵۱

**شب بد، فردا روتین.**

بخش ۶

# کتابخونه‌ی تمرین‌ها

هر تمرین این کتاب در این بخش یک صفحه‌ی کامل داره: عکس، وضعیت شروع، مراحل اجرا، عضله‌ی هدف، مقدار، راه ساده‌تر و سخت‌تر، اشتباه‌های رایج و نکته‌های ایمنی.

قانون تمرین: ورزش متوسط و منظم، صبح یا عصر زود؛ ورزش خیلی شدید درست قبل از خواب نه. کشش ساق و ران قبل از خواب. اگه بعد از ورزش همون شب بدتر شدی، دفعه‌ی بعد سبک‌تر یا زودتر. با ورم و درد ناگهانی یک ساق، قطع کن و همون روز پزشک.

تمرین ۱ | سطح ۱ · آسان | شروع و تنفس



# تنفس شکمی

## شروع

به پشت دراز بکش، زانوها خم، یک دست روی سینه و یک دست روی شکم.

## اجرا

1. شونه‌ها شل؛ صاف بشین.
2. از بینی حدود ۲ ثانیه دم.
3. با لب‌های غنچه‌شده حدود ۴ ثانیه آهسته بازدم.
4. زور نزن؛ فقط آهسته.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | دیافراگم |
| **چرا این تمرین؟** | تنفس آروم با بازدم طولانی؛ قبل از خواب برای آروم شدن بدن و کم کردن بی‌قراری. |
| **کجا باید حس کنی** | بالا و پایین رفتن شکم. |
| **مقدار** | ۵ دقیقه، ۱ تا ۳ بار در روز. |
| **ساده‌ترش کن** | نشسته. |

**اشتباه‌های رایج:** نفس‌های سریع و سطحی؛ بالا بردن شونه‌ها.

تمرین ۲ | سطح ۰۱ آسان | شروع و تنفس



# پمپ مچ پا

## شروع

به پشت دراز بکش یا بشین، پاها صاف و پاشنه‌ها روی تخت.

## اجرا

1. پنجه‌ی پا رو تا جایی که می‌تونی به سمت خودت بکش.
2. بعد پنجه رو مثل پدال گاز به سمت پایین فشار بده.
3. حرکت رو آهسته و در تمام دامنه انجام بده.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات ساق و جلوی ساق |
| **چرا این تمرین؟** | حرکت مچ پا در نشستن طولانی (سینما، هواپیما، مهمونی) تا بی‌قراری کمتر بشه. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت و جلوی ساق، گاهی کمی در پشت زانو. |
| **مقدار** | ۲۰ تا ۳۰ بار، هر ساعت بیداری (بعد از عمل)؛ در بقیه‌ی موارد ۲ تا ۳ بار در روز. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کوتاه‌تر یا یک پا در هر بار. |
| **سخت‌ترش کن** | در حالت نشسته با کش دور پنجه (فقط برای فشار به پایین). |

**اشتباه‌های رایج:** حرکت سریع و ضربه‌ای؛ نگه داشتن نفس.

تمرین ۳ | سطح ۱ · آسان | شروع و تنفس



# رژه در حالت نشسته

## شروع

روی صندلی بشین، پشت صاف.

## اجرا

1. یک زانو رو ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر بالا بیار.
2. ۲ ثانیه نگه دار و پایین بیار.
3. پاها رو عوض کن.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | خم‌کننده‌های ران |
| **چرا این تمرین؟** | شروع حرکت برای کسی که ایستادن طولانی براش سخته؛ گردش خون و فعال کردن پاها. |
| **کجا باید حس کنی** | جلوی لگن و ران. |
| **مقدار** | ۱۰ تا ۱۵ تکرار هر پا × ۲ ست. |
| **سخت‌ترش کن** | وزنه‌ی مچ یا انجام در حالت ایستاده با گرفتن صندلی. |

**اشتباه‌های رایج:** عقب رفتن تنه.

تمرین ۴ | سطح ۰۱ آسان | شروع و تنفس



# چرخوندن شونه‌ها

## شروع

صاف بشین یا بایست.

## اجرا

1. شونه‌ها رو بالا، عقب و پایین بچرخون.
2. حرکت آهسته و دایره‌ای.
3. ۱۰ بار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات شونه و گردن |
| **چرا این تمرین؟** | شل کردن عضلات بالای شونه؛ مناسب برای وقفه‌های کاری. |
| **مقدار** | ۱۰ تکرار، چند بار در روز. |

**اشتباه‌های رایج:** حرکت سریع.

تمرین ۵ سطح ۰۱ آسان شروع و تنفس



# چرخش فعال گردن

## شروع

صاف روی صندلی بشین، شونه‌ها شل.

## اجرا

1. سر رو آهسته به یک طرف بچرخون تا جایی که راحتی، نگاه افقی.
2. ۲ ثانیه نگه دار.
3. به وسط و بعد طرف دیگه.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات و مفاصل گردن |
| **چرا این تمرین؟** | حفظ و بازگرداندن چرخش گردن؛ لازم برای رانندگی و عبور از خیابون. |
| **کجا باید حس کنی** | کشش ملایم کنار گردن. |
| **مقدار** | ۱۰ تکرار هر طرف، چند بار در روز. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کمتر. |
| **سخت‌ترش کن** | در انتهای دامنه با دست فشار خیلی ملایم بده. |

**اشتباه‌های رایج:** بالا بردن شونه؛ حرکت سریع.

تمرین ۶ | سطح ۱ · آسان | شروع و تنفس



# عقب بردن چونه

## شروع

صاف بشین یا بایست، نگاه افقی.

## اجرا

1. چونه رو بدون پایین آوردن سر، مستقیم به عقب ببر (دو غبغب!).
2. ۵ تا ۱۰ ثانیه نگه دار.
3. شل کن.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | خم‌کننده‌های عمقی گردن |
| **چرا این تمرین؟** | پایه‌ی بیشتر برنامه‌ها: فعال کردن عضلات عمقی گردن و کم کردن جلو آمدن سر. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت گردن کمی کشیده؛ جلوی گردن کمی فعال. |
| **مقدار** | ۱۰ تکرار، چند بار در روز. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کم. |
| **سخت‌ترش کن** | درازکش یا بلند کردن سر. |

**اشتباه‌های رایج:** پایین انداختن سر و نگاه به زمین؛ سفت کردن فک.

تمرین ۷ | سطح ۰۱ آسان | شروع و تنفس



# خم کردن گردن به پهلو

## شروع

صاف بشین.

## اجرا

1. گوش رو به سمت شونه ببر (شونه رو بالا نیار).
2. ۲ ثانیه نگه دار.
3. طرف دیگه.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | کنار گردن |
| **چرا این تمرین؟** | تحرک کنار گردن. |
| **کجا باید حس کنی** | کشش طرف مقابل. |
| **مقدار** | ۱۰ تکرار هر طرف. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کمتر. |

**اشتباه‌های رایج:** چرخیدن سر؛ بالا آوردن شونه.

تمرین ۸ | سطح ۱ · آسان | شروع و تنفس



# فشردن کتف‌ها

## شروع

صاف بشین، دست‌ها روی ران.

## اجرا

1. کتف‌ها رو به عقب و کمی پایین به هم نزدیک کن.
2. ۵ ثانیه نگه دار.
3. شل کن.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات بین کتف |
| **چرا این تمرین؟** | فعال کردن عضلات بین کتف و کم کردن قوز. |
| **کجا باید حس کنی** | بین کتف‌ها. |
| **مقدار** | ۱۰ تکرار × ۲ تا ۳ ست. |
| **سخت‌ترش کن** | با کش. |

**اشتباه‌های رایج:** بالا بردن شونه‌ها؛ قوس دادن کمر.

تمرین ۹ | سطح ۱ · آسان | شروع و تنفس



# تاب دادن زانوها

## شروع

به پشت دراز بکش، زانوها خم و کنار هم، کف پاها روی زمین.

## اجرا

1. زانوها رو آهسته به یک طرف ببر، فقط تا جایی که راحتی.
2. برگرد وسط.
3. به طرف دیگه.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات کمر و لگن |
| **چرا این تمرین؟** | حرکت ملایم چرخشی که برای خیلی‌ها درد کمر رو در روزهای اول کم می‌کنه. |
| **کجا باید حس کنی** | کشش ملایم در کمر و باسن. |
| **مقدار** | ۱۰ تا ۱۵ بار، چند بار در روز. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کوچیک‌تر. |
| **سخت‌ترش کن** | نگه داشتن ۵ ثانیه در هر طرف. |

**اشتباه‌های رایج:** بلند شدن شونه‌ها از زمین؛ رفتن به دامنه‌ی دردناک.

تمرین ۱۰ | سطح ۱ · آسان | شروع و تنفس



# رژه‌ی ایستاده با تکیه

## شروع

پشت صندلی محکم یا کنار کابینت بایست و با دو دست بگیر.

## اجرا

1. زانو رو آهسته تا ارتفاع راحت (کمتر از ۹۰ درجه) بالا بیار.
2. پایین بذار و پای دیگه رو بالا بیار.
3. تنه صاف بمونه.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | خم‌کننده‌های ران، عضلات کناری لگن پای ایستاده |
| **چرا این تمرین؟** | گرم کردن و سرد کردن آروم؛ و هوازی سبک در خونه. |
| **کجا باید حس کنی** | جلوی ران پای در حال بالا اومدن؛ کنار لگن پای ایستاده. |
| **مقدار** | ۲ تا ۳ ست × ۱۰ تکرار هر پا. |
| **ساده‌ترش کن** | ارتفاع کمتر. |
| **سخت‌ترش کن** | نگه داشتن ۳ ثانیه روی یک پا، یا با یک دست. |

**اشتباه‌های رایج:** خم شدن تنه به عقب یا کنار؛ بالا آوردن پا با تاب دادن تنه.

**احتیاط:** کنار کابینت یا میز محکم؛ تکیه‌گاه همیشه در دسترس.

تمرین ۱۱ | سطح ۱ · آسان | هوازی



# برنامه‌ی پیاده‌روی

## شروع

کفش راحت با کف نرم و پاشنه‌ی کوتاه. مسیر صاف و ایمن.

## اجرا

1. با مدتی شروع کن که درد کم و قابل‌تحمل بمونه (حتی ۵ دقیقه).
2. سرعت طوری باشه که بتونی حرف بزنی ولی آواز خوندن سخت باشه.
3. هر هفته ۱۰ درصد به کل زمان اضافه کن.
4. هدف: ۱۵۰ دقیقه در هفته (مثلاً ۳۰ دقیقه، ۵ روز).

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | قلب و ریه، کل پا |
| **چرا این تمرین؟** | پیاده‌روی متوسط در روز یا عصر زود؛ در کارآزمایی ورزش، برنامه‌ی هوازی و قدرت پا علائم پاهای بی‌قرار رو کم کرد. |
| **مقدار** | ۳۰ دقیقه، ۳ تا ۵ روز در هفته؛ نه ورزش شدید درست قبل از خواب. |
| **ساده‌ترش کن** | تقسیم به نوبت‌های ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای. |
| **سخت‌ترش کن** | سرعت بیشتر، سربالایی ملایم. |

**اشتباه‌های رایج:** افزایش ناگهانی مسافت؛ کفش نامناسب.

**احتیاط:** ورزش خیلی شدید یا طولانی گاهی همون شب علائم رو بیشتر می‌کنه؛ متوسط بمون.

تمرین ۱۲ | سطح ۱ · آسان | هوازی



# دوچرخه‌ی ثابت

## شروع

ارتفاع زین رو طوری تنظیم کن که وقتی پدال پایینه، زانو کمی خم بمونه (حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه).

## اجرا

1. با مقاومت کم شروع کن.
2. اگه دور کامل سخته، اول پدال رو جلو و عقب تاب بده تا بتونی دور کامل بزنی.
3. سرعت راحت؛ باید بتونی حرف بزنی.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | کل پا؛ قلب و ریه |
| **چرا این تمرین؟** | هوازی کنترل‌شده در خونه؛ شدت رو راحت می‌شه تنظیم کرد. |
| **کجا باید حس کنی** | ران‌ها؛ کمی گرما در زانو طبیعیه. |
| **مقدار** | ۱۰ دقیقه؛ هر هفته ۲ تا ۵ دقیقه اضافه کن تا ۳۰ دقیقه. |
| **ساده‌ترش کن** | زین بالاتر. |
| **سخت‌ترش کن** | مقاومت بیشتر یا فاصله‌ای (۱ دقیقه تند، ۲ دقیقه آروم). |

**اشتباه‌های رایج:** زین خیلی پایین (فشار پشت کشکک زیاد می‌شه)؛ مقاومت خیلی زیاد در شروع.

**احتیاط:** شدت سبک تا متوسط؛ تست صحبت.

تمرین ۱۳ | سطح ۱ · آسان | هوازی



# تمرین پله

## شروع

جلوی پله بایست و نرده رو با دست سمت پای سالم بگیر (یا با هر دو دست).

## اجرا

1. **بالا رفتن:** اول پای سالم، بعد پای دردناک، بعد عصا (اگه داری).
2. **پایین اومدن:** اول عصا، بعد پای دردناک، بعد پای سالم.
3. یادآور: «خوب‌ها می‌رن بالا، بدها میان پایین».
4. وقتی قوی‌تر شدی، به الگوی یک‌پا در هر پله برگرد.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | کاربردی |
| **چرا این تمرین؟** | هوازی شدیدتر و تقویت پا؛ پله‌های روزمره رو به تمرین تبدیل کن. |
| **مقدار** | ۵ تا ۱۰ پله رفت‌وبرگشت، ۱ تا ۲ بار در روز. |
| **سخت‌ترش کن** | پله‌ی یک‌پا در هر پله بدون نرده (فقط وقتی کاملاً ایمنه). |

**اشتباه‌های رایج:** رها کردن نرده؛ عجله.

**احتیاط:** وقتی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پیاده‌روی راحت شد؛ آهسته، با نرده، و با توقف در پاگرد.

تمرین ۱۴ | سطح ۱ · آسان | هوازی



# ورزش در آب

## شروع

استخر با آب تا سطح کمر یا سینه.

## اجرا

1. راه رفتن رو به جلو، عقب و پهلو در آب.
2. بالا آوردن زانوها.
3. اسکوات کوتاه با گرفتن لبه‌ی استخر.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | کل بدن |
| **چرا این تمرین؟** | ورزش در آب برای مفاصل راحته. |
| **مقدار** | ۲۰ تا ۴۰ دقیقه، ۲ تا ۳ بار در هفته. |

**اشتباه‌های رایج:** لیز خوردن کنار استخر (دمپایی مناسب بپوش).

**احتیاط:** آب خیلی گرم یا خیلی سرد گاهی علائم رو تغییر می‌ده؛ ببین برای تو کدوم بهتره.

تمرین ۱۵ | سطح ۰۱ آسان | قدرتی سبک



# بلند شدن از صندلی

## شروع

روی لبه‌ی جلویی صندلی محکم بشین، پاها به عرض لگن، کمی عقب‌تر از زانوها.

## اجرا

1. دست‌ها روی سینه (یا روی ران اگه لازمه).
2. تنه رو با کمر صاف به جلو خم کن تا «بینی از روی پنجه رد بشه».
3. از طریق پاشنه‌ها فشار بده و کامل بایست؛ لگن و زانو صاف.
4. در ۳ ثانیه، با کنترل و آهسته بشین؛ نیفت.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | چهارسر، باسن، ساق |
| **چرا این تمرین؟** | مهم‌ترین تمرین کاربردی؛ همون حرکتی که در توالت، ماشین و مهمونی انجام می‌دی. در بیشتر برنامه‌ها حضور داره. |
| **کجا باید حس کنی** | جلوی ران و باسن. |
| **مقدار** | ۸ تا ۱۲ تکرار × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | صندلی بلندتر (یک بالش زیر باسن) یا کمک دست از روی ران. |
| **سخت‌ترش کن** | صندلی کوتاه‌تر، نشستن ۵ ثانیه‌ای، دمبل در دست، یا لمس صندلی بدون نشستن کامل. |

**اشتباه‌های رایج:** جمع شدن زانوها به داخل؛ افتادن روی صندلی؛ بلند شدن پاشنه‌ها؛ خم شدن زیاد سر و گردن.

تمرین ۱۶ سطح ۲ · متوسط قدرتی سبک



# اسکوات کوتاه با تکیه

## شروع

پشت صندلی یا جلوی میز بایست و با دو دست سبک بگیرش. پاها کمی بازتر از عرض لگن.

## اجرا

1. لگن رو به عقب بفرست، انگار می‌خوای روی صندلی بشینی.
2. تا حدود ۴۵ تا ۶۰ درجه خم شدن زانو پایین برو.
3. از طریق پاشنه‌ها بالا بیا.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | چهارسر، باسن |
| **چرا این تمرین؟** | پل ارتباطی بین بلند شدن از صندلی و اسکوات کامل. |
| **کجا باید حس کنی** | ران و باسن. |
| **مقدار** | ۱۰ تا ۱۵ تکرار × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | عمق کمتر. |
| **سخت‌ترش کن** | بدون تکیه، عمق بیشتر، یا دمبل در دست. |

**اشتباه‌های رایج:** رفتن وزن روی پنجه‌ها؛ جمع شدن زانوها به داخل؛ گرد شدن کمر.

تمرین ۱۷ | سطح ۰۱ آسان | قدرتی سبک



# بالا رفتن روی پنجه

## شروع

پشت صندلی یا جلوی دیوار بایست و سبک بگیرش، پاها به عرض لگن.

## اجرا

1. روی پنجه‌ها تا جای ممکن بالا برو.
2. ۲ ثانیه نگه دار.
3. در ۳ ثانیه آهسته پایین بیا.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات ساق |
| **چرا این تمرین؟** | ساق قوی بخشی از ضربه‌ی هر قدم رو قبل از رسیدن به زانو جذب می‌کنه؛ برای تعادل هم مهمه. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت ساق. |
| **مقدار** | ۱۵ تا ۲۰ تکرار × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | در حالت نشسته. |
| **سخت‌ترش کن** | روی یک پا، یا روی لبه‌ی پله با پایین رفتن پاشنه. |

**اشتباه‌های رایج:** چرخیدن مچ به بیرون؛ پایین افتادن سریع.

تمرین ۱۸ | سطح ۱۰ آسان | قدرتی سبک



# بالا آوردن پنجه (ایستادن روی پاشنه)

## شروع

پشت یک صندلی محکم یا کابینت بایست و با دو دست بگیر؛ پاها به عرض لگن.

## اجرا

1. پنجه‌ها رو تا جایی که می‌تونی از زمین بلند کن و روی پاشنه‌ها بمون.
2. ۲ ثانیه نگه دار.
3. آهسته پایین بیار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات جلوی ساق |
| **چرا این تمرین؟** | عضلات جلوی ساق، پنجه رو موقع راه رفتن بالا نگه می‌دارن؛ ضعفشون باعث گیر کردن پنجه به لبه‌ی فرش و پله می‌شه. |
| **کجا باید حس کنی** | جلوی ساق پا. |
| **مقدار** | ۲ تا ۳ ست × ۱۰ تا ۱۲ تکرار. |
| **ساده‌ترش کن** | نشسته روی صندلی. |
| **سخت‌ترش کن** | با یک دست تکیه، یا چند قدم راه رفتن روی پاشنه کنار کابینت. |

**اشتباه‌های رایج:** خم شدن باسن به عقب؛ رها کردن تکیه‌گاه.

**احتیاط:** کنار کابینت یا میز محکم؛ تکیه‌گاه همیشه در دسترس.

تمرین ۱۹ | سطح ۲ · متوسط | قدرتی سبک



# دور کردن پا با کش (ایستاده)

## شروع

کش حلقه‌ای رو دور مچ‌ها یا بالای زانوها بذار. پشت صندلی بایست و بگیرش.

## اجرا

1. پا رو صاف و کمی رو به عقب، به پهلو باز کن.
2. تنه صاف بمونه و به طرف دیگه خم نشه.
3. آهسته برگردون.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | سرینی میانی |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت عضلات کنار لگن در حالت ایستاده؛ هم پای حرکت‌کننده و هم پای ایستاده کار می‌کنن. |
| **کجا باید حس کنی** | کنار لگن هر دو پا. |
| **مقدار** | ۱۲ تا ۱۵ تکرار هر پا × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | بدون کش. |
| **سخت‌ترش کن** | کش محکم‌تر. |

**اشتباه‌های رایج:** خم شدن تنه به طرف مقابل؛ چرخیدن پنجه به بیرون.

تمرین ۲۰ | سطح ۱ · آسان | قدرتی سبک



# صاف کردن ران به عقب (ایستاده)

## شروع

پشت یک صندلی محکم یا کنار کابینت بایست و با دو دست بگیر.

## اجرا

1. باسن رو سفت کن و پای صاف رو آهسته به عقب ببر.
2. تنه صاف بمونه؛ به جلو خم نشو.
3. ۲ ثانیه نگه دار و آهسته برگردون.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | سرینی بزرگ، پشت ران |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت سرینی بزرگ و حفظ صاف شدن کامل ران؛ برای راه رفتن صاف و قدم بلندتر. |
| **کجا باید حس کنی** | باسن پای در حال حرکت. |
| **مقدار** | ۲ تا ۳ ست × ۱۰ تا ۱۲ تکرار. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کوتاه‌تر. |
| **سخت‌ترش کن** | کش حلقه‌ای دور مچ‌ها. |

**اشتباه‌های رایج:** قوس دادن کمر؛ خم شدن تنه به جلو؛ چرخیدن لگن.

**احتیاط:** کنار کابینت یا میز محکم.

تمرین ۲۱ | سطح ۰۱ آسان | قدرتی سبک



# خم کردن زانو در حالت ایستاده

## شروع

پشت یک صندلی بایست و پشتی رو بگیر.

## اجرا

1. زانو رو خم کن و پاشنه رو به سمت باسن ببر. ران‌ها کنار هم بمونن.
2. ۲ ثانیه نگه دار.
3. آهسته پایین بیار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | همسترینگ |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت پشت ران؛ مهم برای ثبات زانو و راه رفتن. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت ران. |
| **مقدار** | ۱۰ تا ۱۵ تکرار × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کمتر. |
| **سخت‌ترش کن** | وزنه‌ی مچ. |

**اشتباه‌های رایج:** جلو بردن ران؛ خم شدن تنه به جلو؛ تاب دادن.

تمرین ۲۲ | سطح ۰۱ آسان | قدرتی سبک



# صاف کردن زانو در حالت نشسته

## شروع

روی صندلی بشین، پشتت صاف و به پشتی تکیه بده. کف پاها روی زمین.

## اجرا

1. پنجه رو به سمت خودت بکش و زانو رو آهسته صاف کن.
2. در بالا ۲ تا ۳ ثانیه عضله‌ی ران رو سفت نگه دار.
3. در ۳ ثانیه آهسته پایین بیار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | چهارسر ران |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت مستقیم عضله‌ی چهارسر، قابل‌انجام در هر جایی؛ حتی جلوی تلویزیون. |
| **کجا باید حس کنی** | جلوی ران. |
| **مقدار** | ۱۰ تا ۱۵ تکرار × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کوتاه‌تر (فقط تا نیمه). |
| **سخت‌ترش کن** | وزنه‌ی مچ (از ۰.۵ کیلو شروع کن) یا کش مقاومتی که دور پایه‌ی صندلی بسته شده. |

**اشتباه‌های رایج:** تاب دادن پا؛ قوز کردن یا عقب رفتن تنه؛ صاف نکردن کامل زانو.

**احتیاط:** نفس رو حبس نکن؛ موقع زور بازدم.

تمرین ۲۳ | سطح ۰۱ آسان | قدرتی سبک



# پل باسن

## شروع

به پشت دراز بکش، زانوها خم، کف پاها روی زمین به عرض لگن، دست‌ها کنار بدن.

## اجرا

1. باسن رو سفت کن و لگن رو بالا ببر تا شونه، لگن و زانو در یک خط باشن.
2. ۲ تا ۳ ثانیه نگه دار.
3. مهره‌به‌مهره پایین بیا.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | سرینی بزرگ، همسترینگ |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت باسن و پشت ران که فشار رو از روی زانو برمی‌دارن. |
| **کجا باید حس کنی** | باسن و پشت ران. نه کمر. |
| **مقدار** | ۱۰ تا ۱۵ تکرار × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | ارتفاع کمتر. |
| **سخت‌ترش کن** | پل یک‌پا یا کش دور ران. |

**اشتباه‌های رایج:** قوس دادن زیاد کمر؛ باز شدن زانوها از هم یا جمع شدنشون به داخل؛ فشار روی گردن.

تمرین ۲۴ | سطح ۲ · متوسط | قدرتی سبک



# بالا رفتن از پله

## شروع

جلوی پله‌ی اول یا سکوی ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متری بایست؛ نرده یا دیوار در دسترس.

## اجرا

1. کل پای جلو رو روی پله بذار.
2. با فشار همون پا (نه هل دادن پای عقب) بالا برو و بایست.
3. با همون پا آهسته پایین بیا.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | چهارسر، باسن |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت کاربردی برای پله، کوه و سوار شدن به اتوبوس. |
| **کجا باید حس کنی** | ران و باسن پای جلو. |
| **مقدار** | ۱۰ تا ۱۲ تکرار هر پا × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | پله‌ی کوتاه‌تر و گرفتن نرده با دو دست. |
| **سخت‌ترش کن** | پله‌ی بلندتر، دمبل در دست، یا پایین اومدن ۳ ثانیه‌ای. |

**اشتباه‌های رایج:** جمع شدن زانو به داخل؛ هل دادن با پای پایین؛ خم شدن زیاد به جلو.

تمرین ۲۵ | سطح ۲ · متوسط | قدرتی سبک



# بالا رفتن از پله از پهلو

## شروع

کنار پله بایست، پهلو به پله.

## اجرا

1. پای نزدیک به پله رو روی پله بذار.
2. با فشار اون پا بالا برو تا پای دیگه از زمین جدا بشه.
3. آهسته پایین بیا.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | سرینی میانی، چهارسر |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت باسن و ران در صفحه‌ای که در زندگی روزمره کمتر تمرین می‌شه. |
| **کجا باید حس کنی** | کنار لگن و ران. |
| **مقدار** | ۱۰ تکرار هر طرف × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | پله‌ی کوتاه‌تر. |
| **سخت‌ترش کن** | پله‌ی بلندتر یا دمبل. |

**اشتباه‌های رایج:** افتادن لگن؛ جمع شدن زانو به داخل.

تمرین ۲۶ | سطح ۲ · متوسط | قدرتی سبک



# خم شدن از لگن (لولا)

## شروع

صاف بایست، پاها به عرض لگن، زانوها کمی خم، دست‌ها روی ران.

## اجرا

1. لگن رو به عقب بفرست و تنه رو با کمر صاف به جلو خم کن.
2. وقتی کشش پشت ران رو حس کردی، باسن رو سفت کن و برگرد.
3. کمر در تمام مدت صاف بمونه.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | باسن، همسترینگ، عضلات پشت |
| **چرا این تمرین؟** | یاد گرفتن خم شدن با کمک لگن؛ پایه‌ی بلند کردن بار. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت ران و باسن. |
| **مقدار** | ۱۰ تکرار × ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کمتر یا با یک چوب پشت سر برای بازخورد. |
| **سخت‌ترش کن** | بطری آب یا دمبل در دست. |

**اشتباه‌های رایج:** گرد شدن کمر؛ تبدیل شدن به اسکوات.

تمرین ۲۷ | سطح ۳ · پیشرفته | قدرتی سبک



# پل باسن یک‌پا

## شروع

مثل پل باسن دراز بکش. یک زانو رو صاف کن یا به سمت سینه بیار.

## اجرا

1. با فشار پای روی زمین، لگن رو بالا ببر.
2. لگن صاف بمونه و به یک طرف نیفته.
3. آهسته پایین بیا.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | سرینی بزرگ و میانی، همسترینگ |
| **چرا این تمرین؟** | نسخه‌ی پیشرفته‌ی پل؛ هر طرف جداگانه قوی می‌شه. |
| **کجا باید حس کنی** | باسن و پشت ران پای روی زمین. |
| **مقدار** | ۸ تا ۱۰ تکرار هر پا × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | پل معمولی. |
| **سخت‌ترش کن** | پاشنه روی پله. |

**اشتباه‌های رایج:** چرخیدن لگن؛ قوس کمر.

تمرین ۲۸ | سطح ۰۱ آسان | قدرتی سبک



# صدفی

## شروع

به پهلو دراز بکش، زانوها حدود ۴۵ درجه خم و پاها روی هم.

## اجرا

1. پاها رو به هم چسبیده نگه دار و زانوی بالایی رو مثل باز شدن صدف بالا ببر.
2. لگن نباید به عقب بچرخه.
3. ۲ ثانیه نگه دار و آهسته ببند.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | سرینی میانی و چرخاننده‌های ران |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت عضلات کنترل‌کننده‌ی چرخش ران. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت و کنار باسن. |
| **مقدار** | ۱۲ تا ۱۵ تکرار × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کمتر. |
| **سخت‌ترش کن** | کش حلقه‌ای دور ران، بالای زانو. |

**اشتباه‌های رایج:** چرخیدن لگن و تنه به عقب؛ حرکت سریع.

تمرین ۲۹ | سطح ۳ · پیشرفته | قدرتی سبک



# راه رفتن پهلو با کش

## شروع

کش حلقه‌ای رو بالای زانوها یا دور مچ بذار. کمی زانوها رو خم کن (نیمه‌اسکوات).

## اجرا

1. یک قدم به پهلو بردار و کش رو کشیده نگه دار.
2. پای دیگه رو نزدیک بیار، ولی نه کامل؛ کش همیشه کشیده بمونه.
3. ۱۰ قدم به یک طرف و ۱۰ قدم برگرد.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | سرینی میانی |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت باسن به شکل کاربردی و پویا. |
| **کجا باید حس کنی** | کنار لگن. |
| **مقدار** | ۲ تا ۳ رفت‌وبرگشت. |
| **ساده‌ترش کن** | بدون کش، کنار دیوار. |
| **سخت‌ترش کن** | کش محکم‌تر یا پایین‌تر بودن. |

**اشتباه‌های رایج:** بالا و پایین رفتن بدن؛ جمع شدن زانوها به داخل.

تمرین ۳۰ | سطح ۲ · متوسط | قدرتی سبک



# خم کردن زانو با کش (نشسته)

## شروع

روی صندلی بشین. کش رو به یک نقطه‌ی محکم جلوی خودت ببند و دور مچ پا بنداز.

## اجرا

1. زانو رو در برابر کش به عقب خم کن و پاشنه رو زیر صندلی بکش.
2. ۲ ثانیه نگه دار.
3. آهسته برگرد.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | همسترینگ |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت پشت ران با مقاومت. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت ران. |
| **مقدار** | ۱۲ تا ۱۵ تکرار × ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | کش سبک‌تر. |
| **سخت‌ترش کن** | کش محکم‌تر. |

**اشتباه‌های رایج:** رها کردن ناگهانی کش.

تمرین ۳۱ | سطح ۱ · آسان | قدرتی سبک



# کشیدن کش (پارویی)

## شروع

روی صندلی، پاها صاف، کش دور کف پاها.

## اجرا

1. آرنج‌ها رو به عقب بکش و کتف‌ها رو به هم نزدیک کن.
2. آهسته برگرد.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات پشت و بین کتف |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت عضلاتی که سر و شونه‌ها رو در وضعیت بهتر نگه می‌دارن. |
| **کجا باید حس کنی** | بین کتف‌ها. |
| **مقدار** | ۱۲ تا ۱۵ تکرار × ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | کش سبک‌تر. |
| **سخت‌ترش کن** | کش محکم‌تر. |

**اشتباه‌های رایج:** بالا بردن شونه‌ها.

**احتیاط:** نفس رو حبس نکن؛ وزنه رو کم‌کم سنگین کن.

تمرین ۳۲ | سطح ۲ · متوسط | قدرتی سبک



# پارویی یک‌دست با دمبل

## شروع

یک دست و یک زانو روی صندلی یا نیمکت، کمر صاف، دمبل در دست دیگه.

## اجرا

1. دمبل رو به سمت لگن بکش.
2. آرنج نزدیک بدن.
3. آهسته پایین بیار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات پشت |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت پشت با حمایت دست دیگه. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت و بین کتف. |
| **مقدار** | ۱۰ تا ۱۲ تکرار هر طرف × ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | دمبل سبک‌تر. |
| **سخت‌ترش کن** | دمبل سنگین‌تر. |

**اشتباه‌های رایج:** چرخیدن تنه؛ گرد شدن کمر.

**احتیاط:** نفس رو حبس نکن؛ وزنه رو کم‌کم سنگین کن.

تمرین ۳۳ | سطح ۲ · متوسط | قدرتی سبک



# باز کردن کش جلوی سینه

## شروع

بایست، کش رو با دو دست جلوی سینه، آرنج‌ها صاف.

## اجرا

1. کش رو با باز کردن دست‌ها به طرفین بکش تا به سینه برسه.
2. کتف‌ها به هم نزدیک.
3. آهسته برگرد.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات پشت شونه و بین کتف |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت پشت شونه‌ها. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت شونه و بین کتف. |
| **مقدار** | ۱۲ تا ۱۵ تکرار × ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | کش سبک‌تر. |
| **سخت‌ترش کن** | کش محکم‌تر. |

**اشتباه‌های رایج:** بالا بردن شونه‌ها؛ قوس کمر.

**احتیاط:** نفس رو حبس نکن؛ وزنه رو کم‌کم سنگین کن.

تمرین ۳۴ | سطح ۲ · متوسط | قدرتی سبک



# شنای دیواری

## شروع

رو به دیوار، دست‌ها روی دیوار کمی بازتر از شانه.

## اجرا

1. آرنج‌ها رو خم کن و سینه رو به دیوار نزدیک کن.
2. به عقب هل بده و در انتها کتف‌ها رو کمی از هم باز کن (پلاس).
3. بدن صاف.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | سینه، دندانه‌ای قدامی، بازو |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت شانه و کتف با وزن بدن. |
| **کجا باید حس کنی** | سینه و بازو. |
| **مقدار** | ۱۰ تا ۱۲ تکرار × ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | نزدیک‌تر به دیوار. |
| **سخت‌ترش کن** | روی میز یا لبه‌ی کابینت. |

**اشتباه‌های رایج:** افتادن شکم؛ بالا بردن شونه‌ها.

**احتیاط:** نفس رو حبس نکن؛ وزنه رو کم‌کم سنگین کن.

تمرین ۳۵ | سطح ۳ · پیشرفته | قدرتی سبک



# فشار بالای سر با دمبل

## شروع

نشسته یا ایستاده، دمبل‌ها کنار شونه.

## اجرا

1. دمبل‌ها رو به بالا فشار بده.
2. کمر قوس نگیره.
3. آهسته پایین بیار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات شونه |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت شونه برای کارهای بالای سر. |
| **کجا باید حس کنی** | شونه. |
| **مقدار** | ۱۰ تکرار × ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | سبک‌تر یا یک‌دست. |

**اشتباه‌های رایج:** قوس دادن کمر.

**احتیاط:** نفس رو حبس نکن؛ وزنه رو کم‌کم سنگین کن.

تمرین ۳۶ | سطح ۲ · متوسط | قدرتی سبک



# بالا بردن دست در صفحه‌ی کتف

## شروع

بایست، دست‌ها کنار بدن، شست رو به بالا.

## اجرا

1. دست رو صاف، حدود ۳۰ درجه جلوتر از کنار، بالا ببر.
2. اول تا ارتفاع شانه؛ در سطح ۳ تا بالای سر.
3. در ۳ ثانیه پایین بیار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | فوق‌خاری، دلتوئید |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت بالا بردن دست در مسیری که برای شانه طبیعی‌تره. |
| **کجا باید حس کنی** | بالای شانه. |
| **مقدار** | ۱۰ تکرار × ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | بدون وزنه یا دامنه‌ی کمتر. |
| **سخت‌ترش کن** | دمبل ۰.۵ تا ۲ کیلو. |

**اشتباه‌های رایج:** بالا بردن شونه به سمت گوش؛ قوس دادن کمر.

**احتیاط:** نفس رو حبس نکن؛ وزنه رو کم‌کم سنگین کن.

تمرین ۳۷ | سطح ۱۰ آسان | قدرتی سبک



# حشره‌ی مرده

## شروع

به پشت دراز بکش، زانوها خم و پاها روی زمین (نسخه‌ی ساده).

## اجرا

1. شکم رو ملایم سفت کن طوری که پایین کمر بی‌حرکت بمونه.
2. یک پا رو آهسته صاف کن و روی زمین سُر بده.
3. برگردون و طرف دیگه.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات عمقی شکم |
| **چرا این تمرین؟** | کنترل تنه در حالی که دست و پا حرکت می‌کنن؛ پایه‌ی پایداری کمر. |
| **کجا باید حس کنی** | عضلات شکم. |
| **مقدار** | ۶ تا ۱۰ تکرار هر طرف × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | فقط یک پاشنه رو کمی بلند کن. |
| **سخت‌ترش کن** | پاها در هوا با زانوی ۹۰ درجه؛ هم‌زمان دست و پای مخالف. |

**اشتباه‌های رایج:** قوس گرفتن کمر؛ نگه داشتن نفس.

تمرین ۳۸ | سطح ۲ · متوسط | قدرتی سبک



# پرنده‌سگ

## شروع

روی چهار دست‌وپا، دست‌ها زیر شونه، زانوها زیر لگن، کمر صاف.

## اجرا

1. یک دست رو جلو و پای مخالف رو عقب ببر تا با بدن یک خط بسازن.
2. لگن نچرخه و کمر قوس نگیره.
3. ۲ تا ۵ ثانیه نگه دار و برگرد.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات پشت، باسن، شکم |
| **چرا این تمرین؟** | پایداری ستون فقرات در حالی که دست و پا حرکت می‌کنن. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت، باسن و شونه. |
| **مقدار** | ۸ تا ۱۰ تکرار هر طرف × ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | فقط پا یا فقط دست. |
| **سخت‌ترش کن** | نگه داشتن ۱۰ ثانیه یا کش دور مچ. |

**اشتباه‌های رایج:** بالا بردن زیاد پا و قوس کمر؛ چرخیدن لگن.

تمرین ۳۹ | سطح ۳ · پیشرفته | قدرتی سبک



# فشار پالوف با کش

## شروع

کش رو به یک نقطه‌ی محکم هم‌ارتفاع سینه ببند. پهلو به نقطه‌ی اتصال بایست و کش رو با دو دست جلوی سینه بگیر.

## اجرا

1. دست‌ها رو مستقیم جلو ببر.
2. اجازه نده کش بدنت رو بچرخونه.
3. ۲ ثانیه نگه دار و برگرد.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات تنه (ضدچرخش) |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت توانایی تنه برای مقاومت در برابر چرخش؛ کاربردی برای حمل بار. |
| **کجا باید حس کنی** | شکم و کنار تنه. |
| **مقدار** | ۱۰ تکرار هر طرف × ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | کش سبک‌تر. |
| **سخت‌ترش کن** | کش محکم‌تر یا ایستادن با پاهای نزدیک‌تر. |

**اشتباه‌های رایج:** چرخیدن تنه؛ نگه داشتن نفس.

**احتیاط:** نفس رو حبس نکن؛ وزنه رو کم‌کم سنگین کن.

تمرین ۴۰ | سطح ۲ · متوسط | قدرتی سبک



# حمل بار دو دستی

## شروع

دو کیسه‌ی مساوی در دو دست.

## اجرا

1. صاف بایست، شونه‌ها پایین و عقب، چونه کمی عقب.
2. ۲۰ تا ۳۰ متر راه برو.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | کل بدن، شونه و گردن |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت کاربردی برای حمل کیسه‌ی خرید. |
| **مقدار** | ۳ تا ۴ نوبت. |
| **ساده‌ترش کن** | سبک‌تر. |
| **سخت‌ترش کن** | سنگین‌تر. |

**اشتباه‌های رایج:** قوز کردن؛ بالا بردن شونه‌ها.

**احتیاط:** نفس رو حبس نکن؛ وزنه رو کم‌کم سنگین کن.

تمرین ۴۱ سطح ۱۰ آسان تعادل



# جابه‌جایی وزن

## شروع

پشت صندلی بایست و بگیرش، پاها به عرض لگن.

## اجرا

1. وزن رو آهسته به پای راست منتقل کن، بعد به پای چپ.
2. بعد یک پا رو جلو بذار و وزن رو جلو و عقب منتقل کن.
3. حرکت آهسته و کنترل‌شده.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | کنترل تعادل |
| **چرا این تمرین؟** | شروع تمرین تعادل، به‌خصوص بعد از عمل و در افراد با ترس از زمین خوردن. |
| **کجا باید حس کنی** | هر دو پا. |
| **مقدار** | ۱ تا ۲ دقیقه. |
| **سخت‌ترش کن** | بدون گرفتن. |

**اشتباه‌های رایج:** بلند کردن پاها.

تمرین ۴۲ | سطح ۱ · آسان | تعادل



# ایستادن روی یک پا

## شروع

پشت صندلی یا کنار دیوار.

## اجرا

1. یک پا رو کمی بلند کن.
2. زانوی ایستاده کمی خم.
3. تعادلت رو نگه دار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | تعادل |
| **چرا این تمرین؟** | کاهش خطر زمین خوردن. |
| **کجا باید حس کنی** | پای ایستاده. |
| **مقدار** | ۳ × تا ۳۰ ثانیه هر پا. |
| **ساده‌ترش کن** | گرفتن با دو دست. |
| **سخت‌ترش کن** | بدون گرفتن یا روی بالش. |

**اشتباه‌های رایج:** قفل کردن زانو.

**احتیاط:** همیشه کنار تکیه‌گاه.

تمرین ۴۳ سطح ۲ · متوسط تعادل



# راه رفتن پاشنه‌به‌پنجه

## شروع

کنار یک دیوار یا راهروی باریک بایست.

## اجرا

1. قدم بردار طوری که پاشنه‌ی پای جلو دقیقاً جلوی پنجه‌ی پای عقب قرار بگیره.
2. ۱۰ تا ۱۵ قدم برو.
3. برگرد.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | تعادل پویا |
| **چرا این تمرین؟** | تعادل در حین حرکت. |
| **کجا باید حس کنی** | کل بدن. |
| **مقدار** | ۳ تا ۴ رفت‌وبرگشت. |
| **ساده‌ترش کن** | یک دست روی دیوار. |
| **سخت‌ترش کن** | بدون تکیه، یا با نگه داشتن یک لیوان آب. |

**اشتباه‌های رایج:** نگاه کردن به پاها؛ عجله کردن.

**احتیاط:** کنار دیوار و با همراه.

تمرین ۴۴ سطح ۳ · پیشرفته تعادل



# رسیدن ستاره‌ای

## شروع

روی یک پا کنار صندلی بایست.

## اجرا

1. پای آزاد رو به جلو ببر و با پنجه زمین رو لمس کن، برگرد.
2. همین کار رو به پهلو و پشت هم انجام بده.
3. زانوی ایستاده کمی خم و هم‌راستای پنجه.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | کنترل زانو و لگن، تعادل |
| **چرا این تمرین؟** | کنترل زانو در جهت‌های مختلف؛ پیشرفته برای برگشت به فعالیت. |
| **کجا باید حس کنی** | پای ایستاده. |
| **مقدار** | ۵ دور (هر دور ۳ جهت) برای هر پا. |
| **ساده‌ترش کن** | فاصله‌ی کمتر. |
| **سخت‌ترش کن** | فاصله‌ی بیشتر. |

**اشتباه‌های رایج:** جمع شدن زانو به داخل؛ تکیه دادن وزن به پای آزاد.

تمرین ۴۵ | سطح ۲ · متوسط | تعادل



# راه رفتن پهلو

## شروع

رو به کابینت آشپزخونه بایست و با دست‌ها لبه‌اش رو بگیر.

## اجرا

1. با پای راست یک قدم به پهلو بردار، پای چپ رو کنارش بیار.
2. ۱۰ قدم به راست، بعد ۱۰ قدم به چپ.
3. پنجه‌ها رو به جلو و تنه صاف.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات کناری لگن، تعادل جانبی |
| **چرا این تمرین؟** | بیشتر زمین خوردن‌های خطرناک (و شکستگی لگن) با افتادن به **پهلو** اتفاق می‌افتن؛ این تمرین تعادل جانبی رو تقویت می‌کنه. |
| **کجا باید حس کنی** | کنار لگن و ران. |
| **مقدار** | ۲ تا ۳ رفت‌وبرگشت. |
| **ساده‌ترش کن** | قدم کوتاه‌تر، با دو دست. |
| **سخت‌ترش کن** | قدم بلندتر، با کش حلقه‌ای دور مچ‌ها، یا بدون تکیه با تکیه‌گاه در دسترس. |

**اشتباه‌های رایج:** چرخیدن پنجه‌ها به بیرون؛ خم شدن تنه به کنار؛ عجله.

**احتیاط:** کنار کابینت یا میز محکم؛ تکیه‌گاه همیشه در دسترس.

تمرین ۴۶ | سطح ۲ · متوسط | تعادل



# راه رفتن به عقب

## شروع

کنار کابینت آشپزخونه بایست، یک دست روی لبه‌ش؛ مسیر پشت سرت خالی و بدون مانع.

## اجرا

1. با پنجه‌ی پا اول زمین رو لمس کن و آهسته قدم به عقب بردار.
2. ۱۰ قدم به عقب، بعد برگرد و ۱۰ قدم به جلو.
3. تنه صاف؛ نگاه رو به جلو.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | تعادل پویا، عضلات پشت ران و باسن |
| **چرا این تمرین؟** | عقب رفتن (مثلاً برای باز کردن در یا کنار رفتن از جلوی کسی) یکی از موقعیت‌های رایج زمین خوردنه؛ این تمرین مهارتش رو بهتر می‌کنه. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت ران و باسن؛ تمرکز. |
| **مقدار** | ۳ × ۱۰ قدم. |
| **ساده‌ترش کن** | قدم کوتاه‌تر و آهسته‌تر با دو دست. |
| **سخت‌ترش کن** | بدون تکیه (کنار تکیه‌گاه) یا سریع‌تر. |

**اشتباه‌های رایج:** نگاه کردن به پشت و چرخیدن تنه؛ قدم‌های خیلی بلند؛ مسیر پر از مانع.

**احتیاط:** کنار کابینت یا میز محکم؛ تکیه‌گاه همیشه در دسترس.

تمرین ۴۷ | سطح ۱ · آسان | کشش و سرد کردن



# کشش ساق

## شروع

رو به دیوار بایست، دست‌ها روی دیوار. یک پا جلو، یک پا عقب.

## اجرا

1. پاشنه‌ی پای عقب رو روی زمین نگه دار و زانوش صاف.
2. به جلو تکیه بده تا کشش رو حس کنی.
3. بعد زانوی عقب رو کمی خم کن تا قسمت پایین‌تر ساق کشیده بشه.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات دوقلو و نعلی |
| **چرا این تمرین؟** | کشش ساق قبل از خواب؛ برای خیلی‌ها حس بی‌قراری پا رو کم می‌کنه. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت ساق. |
| **مقدار** | ۳۰ ثانیه × ۳ بار هر پا. |
| **ساده‌ترش کن** | فاصله‌ی کمتر از دیوار. |
| **سخت‌ترش کن** | پنجه روی لبه‌ی پله. |

**اشتباه‌های رایج:** بلند شدن پاشنه؛ چرخیدن پا به بیرون.

تمرین ۴۸ | سطح ۰۱ آسان | کشش و سرد کردن



# کشش پشت ران

## شروع

روی لبه‌ی صندلی بشین، یک پا صاف جلو و پاشنه روی زمین.

## اجرا

1. کمر رو صاف نگه دار و از لگن به جلو خم شو.
2. وقتی کشش رو پشت ران حس کردی، نگه دار.
3. نفس عمیق بکش.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | همسترینگ |
| **چرا این تمرین؟** | همسترینگ سفت جلوی صاف شدن کامل زانو رو می‌گیره. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت ران (نه پشت زانو یا ساق). |
| **مقدار** | ۳۰ ثانیه × ۳ بار هر پا. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کمتر. |

**اشتباه‌های رایج:** گرد کردن کمر؛ خم کردن زانو.

تمرین ۴۹ | سطح ۲ · متوسط | کشش و سرد کردن



# کشش جلوی لگن

## شروع

پشت صندلی بایست، یک پا جلو و یک پا عقب مثل قدم بلند.

## اجرا

1. زانوی جلو رو کمی خم کن.
2. باسن پای عقب رو سفت کن و لگن رو کمی به جلو ببر.
3. تنه صاف؛ قوس به کمر نده.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | خم‌کننده‌های ران |
| **چرا این تمرین؟** | خم‌کننده‌های ران سفت، صاف ایستادن و صاف شدن کامل زانو رو سخت می‌کنن. |
| **کجا باید حس کنی** | جلوی لگن و بالای ران پای عقب. |
| **مقدار** | ۳۰ ثانیه × ۳ بار هر پا. |
| **ساده‌ترش کن** | قدم کوتاه‌تر. |
| **سخت‌ترش کن** | دست هم‌طرف رو بالای سر ببر. |

**اشتباه‌های رایج:** قوس دادن کمر.

تمرین ۵۰ | سطح ۲ · متوسط | کشش و سرد کردن



# کشش جلوی ران

## شروع

به پهلو دراز بکش (ایمن‌تر)، یا ایستاده پشت صندلی.

## اجرا

1. زانوی بالایی رو خم کن و مچ پا رو با دست یا یک ملحفه بگیر.
2. پاشنه رو به سمت باسن بکش؛ ران‌ها کنار هم.
3. باسن رو کمی به جلو فشار بده.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | چهارسر ران |
| **چرا این تمرین؟** | کشش جلوی ران؛ بخشی از سرد کردن. |
| **کجا باید حس کنی** | جلوی ران. |
| **مقدار** | ۳۰ ثانیه × ۳ بار هر پا. |
| **ساده‌ترش کن** | از ملحفه یا کمربند کمک بگیر. |

**اشتباه‌های رایج:** قوس دادن کمر؛ دور شدن زانو به بیرون.

**احتیاط:** کنار صندلی یا کابینت؛ دست روی تکیه‌گاه.

تمرین ۵۱ | سطح ۱۰ آسان | کشش و سرد کردن



# کشش باسن (عدد ۴)

## شروع

روی صندلی بشین.

## اجرا

1. مچ یک پا رو روی زانوی پای دیگه بذار (شکل عدد ۴).
2. با کمر صاف به جلو خم شو.
3. نگه دار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات باسن و چرخاننده‌ها |
| **چرا این تمرین؟** | باسن سفت روی راستای ران و زانو اثر می‌ذاره. |
| **کجا باید حس کنی** | باسن پای روی ران. |
| **مقدار** | ۳۰ ثانیه × ۳ بار هر طرف. |
| **ساده‌ترش کن** | فقط پا رو روی پا بذار و خم نشو. |

**اشتباه‌های رایج:** فشار دادن زانو با دست به پایین.

**احتیاط:** اگه به زانو یا لگن فشار میاره، انجام نده.

تمرین ۵۲ | سطح ۰۱ آسان | کشش و سرد کردن



# کشش بالابرنده‌ی کتف

## شروع

صاف بشین.

## اجرا

1. سر رو ۴۵ درجه به یک طرف بچرخون و نگاه رو به جیب پیراهن ببر.
2. با دست همون طرف، فشار ملایم روی پشت سر.
3. نگه دار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | بالابرنده‌ی کتف |
| **چرا این تمرین؟** | کشش عضله‌ی پشت و کنار گردن. |
| **کجا باید حس کنی** | پشت و کنار گردن. |
| **مقدار** | ۳ × ۲۰ تا ۳۰ ثانیه هر طرف. |
| **ساده‌ترش کن** | بدون فشار دست. |

**اشتباه‌های رایج:** کشیدن شدید.

تمرین ۵۳ | سطح ۰۱ آسان | کشش و سرد کردن



# کشش سینه در چهارچوب در

## شروع

در چهارچوب در بایست، ساعدها روی چهارچوب، آرنج‌ها هم‌سطح شونه.

## اجرا

1. یک قدم به جلو بردار تا کشش رو حس کنی.
2. نگه دار.
3. برگرد.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات سینه |
| **چرا این تمرین؟** | عضلات سینه‌ی سفت شونه‌ها رو به جلو می‌کشن. |
| **کجا باید حس کنی** | جلوی سینه و شونه. |
| **مقدار** | ۳ × ۳۰ ثانیه. |
| **ساده‌ترش کن** | یک دست. |

**اشتباه‌های رایج:** قوس دادن کمر.

**احتیاط:** آروم و با نفس آزاد.

تمرین ۵۴ | سطح ۰۱ آسان | کشش و سرد کردن



# کشش ذوزنقه‌ی بالایی

## شروع

صاف بشین، یک دست زیر ران یا لبه‌ی صندلی رو بگیره.

## اجرا

1. سر رو به طرف مقابل خم کن (گوش به شونه).
2. با دست دیگه فشار خیلی ملایم بده.
3. نگه دار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | ذوزنقه‌ی بالایی |
| **چرا این تمرین؟** | کشش عضله‌ی بالای شونه که در گردن‌درد سفت می‌شه. |
| **کجا باید حس کنی** | بالای شونه و کنار گردن. |
| **مقدار** | ۳ × ۲۰ تا ۳۰ ثانیه هر طرف. |
| **ساده‌ترش کن** | بدون کمک دست. |

**اشتباه‌های رایج:** کشیدن شدید؛ چرخیدن سر.

تمرین ۵۵ | سطح ۱۰ آسان | کشش و سرد کردن



# گربه‌شتر

## شروع

روی چهار دست‌وپا روی تشک: دست‌ها زیر شونه، زانوها زیر لگن.

## اجرا

1. پشت رو آهسته گرد کن و سر رو پایین بیار.
2. بعد پشت رو آهسته گود کن و نگاه رو کمی بالا ببر.
3. فقط در دامنه‌ی راحت.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | کل ستون فقرات |
| **چرا این تمرین؟** | حرکت دادن مهره‌به‌مهره‌ی ستون فقرات در دامنه‌ی راحت. |
| **کجا باید حس کنی** | حرکت در کل پشت، بدون درد تیز. |
| **مقدار** | ۸ تا ۱۰ تکرار، ۲ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کمتر یا نسخه‌ی نشسته. |

**اشتباه‌های رایج:** حرکت سریع؛ خم کردن آرنج‌ها.

**احتیاط:** اگه زانو زدن دردناکه، زیر زانوها بالش بذار یا نسخه‌ی نشسته رو انجام بده.

تمرین ۵۶ | سطح ۲ · متوسط | کشش و سرد کردن



# چرخش ملایم پشت (به پهلو)

## شروع

به پهلو دراز بکش، زانوها خم و روی هم، دست‌ها جلو روی هم.

## اجرا

1. دست بالایی رو مثل باز شدن کتاب به سمت دیگه باز کن.
2. سر هم با دست بچرخه؛ زانوها روی هم بمونن.
3. آهسته برگرد.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | ستون پشتی |
| **چرا این تمرین؟** | حفظ تحرک بخش پشتی ستون فقرات. |
| **کجا باید حس کنی** | کشش ملایم پشت و سینه. |
| **مقدار** | ۸ تا ۱۰ تکرار هر طرف. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کمتر. |

**اشتباه‌های رایج:** جدا شدن زانوها.

**احتیاط:** آروم و با نفس آزاد.

تمرین ۵۷ | سطح ۰۱ آسان | کشش و سرد کردن



# چرخش ملایم کمر درازکش

## شروع

به پشت دراز بکش، دست‌ها باز.

## اجرا

1. یک زانو رو خم کن و به آرومی به طرف مقابل ببر.
2. شونه‌ها روی زمین بمونن.
3. ۲۰ ثانیه نگه دار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات کمر و باسن |
| **چرا این تمرین؟** | کشش ملایم کمر و باسن. |
| **کجا باید حس کنی** | کمر و کنار باسن. |
| **مقدار** | ۳ × ۲۰ ثانیه هر طرف. |
| **ساده‌ترش کن** | هر دو زانو خم و دامنه‌ی کم. |

**اشتباه‌های رایج:** فشار دادن زانو به زمین.

**احتیاط:** آروم و با نفس آزاد.

تمرین ۵۸ | سطح ۰۱ آسان | کشش و سرد کردن



# صاف و خم کردن لگن

## شروع

به پشت دراز بکش، زانوها خم.

## اجرا

1. پایین کمر رو آهسته به زمین فشار بده (لگن به عقب می‌چرخه).
2. بعد کمی قوس بده (لگن به جلو).
3. حرکت آهسته و کم‌دامنه.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات شکم و کمر |
| **چرا این تمرین؟** | یاد گرفتن کنترل حرکت لگن و کمر، و حرکت دادن ملایم مهره‌ها. |
| **کجا باید حس کنی** | شکم و پایین کمر. |
| **مقدار** | ۱۰ تا ۱۵ تکرار، ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | فقط در یک جهت. |
| **سخت‌ترش کن** | در حالت نشسته یا ایستاده. |

**اشتباه‌های رایج:** حرکت دادن با پاها؛ نگه داشتن نفس.

تمرین ۵۹ | سطح ۱۰ آسان | تعادل



# ایستادن پشت‌سرهم

## شروع

کنار دیوار یا پشت میز بایست.

## اجرا

1. پاشنه‌ی یک پا رو دقیقاً جلوی پنجه‌ی پای دیگه بذار.
2. تعادلت رو نگه دار، نگاه رو به روبه‌رو.
3. پاها رو جابه‌جا کن.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | تعادل |
| **چرا این تمرین؟** | تمرین تعادل در قاعده‌ی باریک؛ همون چیزی که در تست تعادل سنجیدی. |
| **کجا باید حس کنی** | کل بدن. |
| **مقدار** | ۳ بار × ۳۰ ثانیه برای هر حالت. |
| **ساده‌ترش کن** | پای جلو کمی کنارتر (نیمه‌پشت‌سرهم). |
| **سخت‌ترش کن** | بدون گرفتن، یا چرخاندن سر به چپ و راست. |

**اشتباه‌های رایج:** گرفتن محکم و دائمی تکیه‌گاه.

**احتیاط:** کنار کابینت؛ یک دست نزدیک تکیه‌گاه.

تمرین ۶۰ | سطح ۱ · آسان | شروع و تنفس



# فشردن حوله یا توپ (قدرت دست)

## شروع

پشت میز بشین، ساعد روی میز. یک حوله‌ی لوله‌شده یا توپ نرم رو در دست بگیر.

## اجرا

1. حوله یا توپ رو تا جایی که می‌تونی محکم فشار بده.
2. ۳ تا ۵ ثانیه نگه دار.
3. کاملاً شل کن و تکرار کن.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات ساعد و دست |
| **چرا این تمرین؟** | قدرت گرفتن دست برای باز کردن در شیشه، حمل خرید و گرفتن نرده مهمه؛ و یکی از نشونه‌های سلامت کلی عضلات بدنه. |
| **کجا باید حس کنی** | ساعد و کف دست. |
| **مقدار** | ۲ تا ۳ ست × ۱۰ تکرار هر دست، روزانه. |
| **ساده‌ترش کن** | فشار کمتر، زمان کوتاه‌تر. |
| **سخت‌ترش کن** | توپ سفت‌تر یا فنر دستی. |

**اشتباه‌های رایج:** حبس نفس؛ بالا انداختن شونه.

**احتیاط:** در آرتروز شدید انگشت‌ها یا بعد از شکستگی مچ، فشار ملایم و با نظر درمانگر.

تمرین ۶۱ | سطح ۱۰ آسان | شروع و تنفس



# حرکت آرنج، مچ و انگشت‌ها

## شروع

صاف روی صندلی بشین، بازوها کنار بدن.

## اجرا

1. آرنج رو آهسته خم و صاف کن (با کمک دست دیگه اگه لازمه).
2. مچ رو بالا و پایین ببر و بچرخون.
3. مشت کن و باز کن؛ یک توپ نرم رو فشار بده.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | دست و ساعد |
| **چرا این تمرین؟** | حرکت آرنج، مچ و انگشت‌ها؛ برای روزهای اول و روزهای خستگی. |
| **مقدار** | ۱۰ تکرار هر حرکت، ۳ تا ۴ بار در روز. |

**اشتباه‌های رایج:** حرکت سریع؛ قوز کردن.

تمرین ۶۲ | سطح ۲ · متوسط | هوازی



# مشت‌زنی سایه‌ای

## شروع

نشسته لب صندلی محکم؛ دست‌ها جلوی صورت.

## اجرا

1. با یک دست مشت **کامل و سریع** به جلو بزن و تنه رو بچرخون.
2. دست رو برگردون جلوی صورت.
3. دست دیگه.
4. مشت به بالا و به طرفین هم بزن؛ بلند بشمار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | شونه‌ها، تنه، پاها |
| **چرا این تمرین؟** | هوازی سبک نشسته با حرکت دست‌ها و چرخش تنه؛ برای روزهایی که راه رفتن سخته. |
| **کجا باید حس کنی** | ضربان قلب بالا؛ کار شونه و تنه. |
| **مقدار** | ۳ تا ۵ × ۳۰ ثانیه، ۳۰ ثانیه استراحت. |
| **ساده‌ترش کن** | آهسته‌تر و با یک دست. |
| **سخت‌ترش کن** | با جابه‌جایی پا و سرعت بیشتر. |

**اشتباه‌های رایج:** حبس نفس؛ مشت‌های کوتاه و ناقص.

**احتیاط:** با تست صحبت؛ با سرگیجه بشین.

تمرین ۶۳ | سطح ۰۱ آسان | شروع و تنفس



# بلند شدن از تخت به روش چرخش یک‌تکه

## شروع

به پشت روی تخت.

## اجرا

1. زانوها رو خم کن.
2. مثل یک تنه‌ی درخت، شونه و لگن رو با هم به پهلو بچرخون.
3. پاها رو از لبه‌ی تخت پایین بنداز و هم‌زمان با فشار آرنج و دست بالاتنه رو بالا بیار تا بشینی.
4. برای دراز کشیدن، برعکس.

**چرا این تمرین؟** بلند شدن از تخت بدون زور زدن و حبس نفس؛ آهسته، برای جلوگیری از سرگیجه.

**مقدار** هر بار بلند شدن و دراز کشیدن.

**اشتباه‌های رایج:** نشستن مستقیم مثل درازونشست؛ چرخاندن جداگانه‌ی شونه و لگن.

**احتیاط:** بعد از نشستن، چند ثانیه لب تخت بمون و بعد بایست.

تمرین ۶۴ سطح ۱ · آسان شروع و تنفس



# سوار و پیاده شدن از ماشین

## شروع

صندلی جلوی ماشین رو تا جای ممکن عقب ببر و پشتی رو کمی بخوابون. ماشین کنار جدول نباشه.

## اجرا

1. پشت به ماشین بایست تا پشت پاهات به لبه‌ی صندلی بخوره.
2. دست‌ها رو به داشبورد و چهارچوب در (نه خود در) بگیر.
3. آهسته بشین؛ بعد بدن رو بچرخون و پاها رو یکی‌یکی داخل ببر.
4. برای پیاده شدن، برعکس؛ چند ثانیه بشین، بعد بایست.

**چرا این تمرین؟** سوار و پیاده شدن ایمن از ماشین.

**ساده‌ترش کن** یک کیسه‌ی پلاستیکی روی صندلی، چرخیدن رو آسون‌تر می‌کنه.

**اشتباه‌های رایج:** اول پا گذاشتن داخل ماشین؛ گرفتن در ماشین به‌عنوان تکیه‌گاه.

تمرین ۶۵ سطح ۳ · پیشرفته قدرت



# اسکوات جامی

## شروع

یک دمبل یا کتری پر رو جلوی سینه با دو دست نگه دار، پاها کمی بازتر از لگن.

## اجرا

1. لگن رو عقب و پایین ببر.
2. تنه نسبتاً صاف و زانوها هم‌راستای پنجه.
3. با فشار پاشنه‌ها بالا بیا.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | ران، باسن، تنه |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت پا و تنه با بار جلوی بدن. |
| **کجا باید حس کنی** | ران و باسن. |
| **مقدار** | ۸ تا ۱۰ تکرار × ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | تا روی صندلی بشین. |
| **سخت‌ترش کن** | وزنه‌ی سنگین‌تر یا مکث در پایین. |

**اشتباه‌های رایج:** گرد شدن کمر؛ بلند شدن پاشنه.

تمرین ۶۶ | سطح ۳ · پیشرفته | قدرت



# ددلیفت با دمبل از روی جعبه

## شروع

دو دمبل (یا کیسه) روی یک جعبه یا پله‌ی ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متری جلوی پاها.

## اجرا

1. با لولای لگن و کمی خم کردن زانو پایین برو.
2. دمبل‌ها رو بگیر، شکم رو سفت کن.
3. با فشار پاها و باسن صاف بایست.
4. با همون الگو آهسته برگردون.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | باسن، همسترینگ، پشت |
| **چرا این تمرین؟** | تمرین بلند کردن بار به‌صورت کنترل‌شده و تدریجی؛ آماده کردن کمر برای زندگی واقعی. |
| **کجا باید حس کنی** | باسن، پشت ران و پشت. |
| **مقدار** | ۸ تا ۱۰ تکرار × ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | جعبه‌ی بلندتر یا وزنه‌ی سبک‌تر. |
| **سخت‌ترش کن** | جعبه‌ی کوتاه‌تر، وزنه‌ی سنگین‌تر. |

**اشتباه‌های رایج:** کشیدن با دست‌ها؛ بار دور از بدن.

**احتیاط:** در پوکی استخوان، کمر رو صاف نگه دار و بار رو آهسته بالا ببر.

تمرین ۶۷ سطح ۳ · پیشرفته قدرت



# حمل بار یک‌طرفه (چمدونی)

## شروع

یک دمبل یا کیسه‌ی سنگین در یک دست.

## اجرا

1. صاف بایست؛ اجازه نده بار بدنت رو به یک طرف خم کنه.
2. ۲۰ تا ۳۰ متر راه برو.
3. دست رو عوض کن.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات کنار تنه |
| **چرا این تمرین؟** | تمرین واقعی برای حمل کیسه‌ی خرید و چمدون. |
| **کجا باید حس کنی** | کنار تنه مخالف بار. |
| **مقدار** | ۳ تا ۴ نوبت هر طرف. |
| **ساده‌ترش کن** | بار سبک‌تر یا دو دستی. |
| **سخت‌ترش کن** | بار سنگین‌تر. |

**اشتباه‌های رایج:** خم شدن به طرف بار.

تمرین ۶۸ | سطح ۲ · متوسط | قدرت



# پلانک پهلو روی زانو

## شروع

به پهلو دراز بکش، آرنج زیر شونه، زانوها خم.

## اجرا

1. لگن رو بالا ببر تا بدن از سر تا زانو صاف بشه.
2. نگه دار و عادی نفس بکش.
3. پایین بیا و طرف دیگه.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات کنار تنه و باسن |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت عضلاتی که کمر رو از کنار پایدار می‌کنن. |
| **کجا باید حس کنی** | کنار تنه و لگن. |
| **مقدار** | ۳ × ۱۵ تا ۳۰ ثانیه هر طرف. |
| **ساده‌ترش کن** | زمان کمتر. |
| **سخت‌ترش کن** | پلانک پهلو کامل (روی پا). |

**اشتباه‌های رایج:** افتادن لگن؛ چرخیدن بدن به جلو یا عقب.

**احتیاط:** اگه درد شونه داری، به‌جاش به دیوار تکیه کن (پلانک پهلو ایستاده).

تمرین ۶۹ | سطح ۳ · پیشرفته | قدرت



# لانج به عقب

## شروع

کنار صندلی یا دیوار بایست.

## اجرا

1. یک قدم به عقب بردار و زانوی عقب رو به سمت زمین پایین ببر.
2. بیشتر وزن روی پای جلو بمونه.
3. با فشار پای جلو برگرد به ایستاده.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | چهارسر، باسن |
| **چرا این تمرین؟** | نسخه‌ی کاربردی و نسبتاً کم‌فشار لانج برای زانو. |
| **کجا باید حس کنی** | ران و باسن پای جلو. |
| **مقدار** | ۸ تا ۱۰ تکرار هر پا × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | قدم کوتاه‌تر و دامنه‌ی کمتر. |
| **سخت‌ترش کن** | دمبل در دست. |

**اشتباه‌های رایج:** جمع شدن زانوی جلو به داخل؛ قدم خیلی کوتاه.

تمرین ۷۰ سطح ۳ · پیشرفته قدرت



# اسکوات با پای جلو و عقب

## شروع

یک قدم بلند جلو بردار، پاشنه‌ی پای عقب بلند. کنار دیوار یا صندلی برای حفظ تعادل.

## اجرا

1. بدن رو مستقیم به پایین ببر، زانوی عقب به سمت زمین.
2. تا جایی که بدون درد ممکنه پایین برو.
3. با فشار پای جلو بالا بیا.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | چهارسر، باسن |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت هر پا جداگانه؛ نزدیک به حرکت نشستن روی زمین و بلند شدن. |
| **کجا باید حس کنی** | ران و باسن پای جلو. |
| **مقدار** | ۸ تا ۱۰ تکرار هر پا × ۲ تا ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی خیلی کم و گرفتن تکیه‌گاه با دو دست. |
| **سخت‌ترش کن** | دمبل در دست یا عمق بیشتر. |

**اشتباه‌های رایج:** جلو رفتن زیاد زانو و بلند شدن پاشنه‌ی جلو؛ جمع شدن زانوی جلو به داخل.

**احتیاط:** اگه زانوی عقب به زمین می‌رسه، یک بالش زیرش بذار.

تمرین ۷۱ سطح ۳ · پیشرفته تعادل



# تعادل روی بالش

## شروع

یک بالش سفت یا تشک فومی رو کنار دیوار یا میز بذار.

## اجرا

1. روی بالش با دو پا بایست؛ وقتی راحت شد، روی یک پا.
2. زانو کمی خم.
3. تعادل رو حفظ کن.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | حس عمقی مچ و زانو |
| **چرا این تمرین؟** | سخت کردن تمرین تعادل با سطح ناپایدار. |
| **کجا باید حس کنی** | کل پای ایستاده. |
| **مقدار** | ۳ بار × ۳۰ ثانیه. |
| **ساده‌ترش کن** | با دو پا. |
| **سخت‌ترش کن** | یک پا + چرخاندن سر، یا گرفتن توپ. |

**اشتباه‌های رایج:** قفل کردن زانو.

**احتیاط:** فقط کنار تکیه‌گاه و با همراه.

تمرین ۷۲ | سطح ۳ · پیشرفته | تعادل



# راه رفتن و دور زدن (شکل ۸)

## شروع

دو صندلی یا دو لیوان پلاستیکی رو با فاصله‌ی حدود ۲ متر روی زمین بذار؛ مسیر امن و بدون فرش لغزنده.

## اجرا

1. آهسته دور دو صندلی به شکل عدد ۸ راه برو.
2. سر دور زدن‌ها، قدم‌های کوتاه بردار؛ روی یک پا نچرخ.
3. بعد جهت رو برعکس کن.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | تعادل پویا، دور زدن |
| **چرا این تمرین؟** | دور زدن و تغییر جهت، یکی از سخت‌ترین بخش‌های راه رفتن برای سالمنداست و زمین خوردن‌های زیادی موقع چرخیدن اتفاق می‌افتن. |
| **کجا باید حس کنی** | تمرکز و کمی خستگی پاها. |
| **مقدار** | ۳ دور در هر جهت. |
| **ساده‌ترش کن** | فاصله‌ی بیشتر بین صندلی‌ها، با عصا یا همراه. |
| **سخت‌ترش کن** | فاصله‌ی کمتر، یا با حمل یک سینی. |

**اشتباه‌های رایج:** چرخیدن روی یک پا؛ عجله؛ نگاه به پایین.

**احتیاط:** در شروع با همراه؛ مسیر رو خالی از مانع کن.

تمرین ۷۳ سطح ۳ · پیشرفته تعادل



# قدم‌برداری چندجهتی

## شروع

کنار یک میز یا کابینت محکم بایست؛ چند نقطه‌ی فرضی روی زمین در جلو، کنار و عقب در نظر بگیر.

## اجرا

1. با یک پا یک قدم بلند به جلو بردار و برگرد.
2. همین کار رو به کنار و به عقب (با احتیاط) انجام بده.
3. به‌تدریج سریع‌تر، با کنترل کامل.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | تعادل پویا، واکنش، عضلات پا |
| **چرا این تمرین؟** | تمرین قدم برداشتن سریع و درست در جهت‌های مختلف؛ همون واکنشی که موقع لیز خوردن یا گیر کردن پا، جلوی زمین خوردن رو می‌گیره. |
| **کجا باید حس کنی** | تمرکز و کمی خستگی پاها. |
| **مقدار** | ۳ × ۳۰ ثانیه، هر پا. |
| **ساده‌ترش کن** | قدم کوتاه‌تر و آهسته‌تر، با دو دست تکیه. |
| **سخت‌ترش کن** | قدم بلندتر، سریع‌تر، یا با نگاه به اطراف. |

**اشتباه‌های رایج:** قدم برداشتن بدون کنترل؛ دور شدن از تکیه‌گاه؛ عجله.

**احتیاط:** حتماً کنار تکیه‌گاه؛ قدم به عقب رو با احتیاط بیشتر.

تمرین ۷۴ | سطح ۰۱ آسان | کشش و سرد کردن



# قدم بلند با حرکت بزرگ دست‌ها

## شروع

صاف بایست، کنار مبل یا کابینت؛ پاها به عرض لگن.

## اجرا

1. با یک پا یک قدم **خیلی بلند** جلو (یا پهلو یا عقب) بردار.
2. هم‌زمان دست‌ها رو **بزرگ و باز** به بالا و طرفین ببر؛ انگشت‌ها باز.
3. وزن رو کامل روی پای جلو ببر و بلند بشمار.
4. با یک قدم بزرگ برگرد.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | کل بدن؛ باسن، ران، شونه‌ها |
| **چرا این تمرین؟** | مقابله با «کوچیک شدن» حرکت‌ها؛ بلند کردن طول قدم و تاب دست‌ها. |
| **کجا باید حس کنی** | کشش و فعالیت در کل بدن؛ حس «بزرگ بودن». |
| **مقدار** | ۸ بار هر پا، به جلو، پهلو و عقب؛ روزانه. |
| **ساده‌ترش کن** | قدم کوتاه‌تر، یک دست روی تکیه‌گاه. |
| **سخت‌ترش کن** | سریع‌تر، با شمارش بلند و بدون تکیه. |

**اشتباه‌های رایج:** قدم کوچیک؛ دست‌های نیمه‌باز؛ نگاه به زمین.

**احتیاط:** در زمان «روشن» و کنار یک تکیه‌گاه؛ در ماه‌های اول با همراه.

تمرین ۷۵ | سطح ۰۱ آسان | کشش و سرد کردن



# چرخش تنه نشسته

## شروع

صاف روی صندلی، دست‌ها ضربدری روی سینه، کف پاها روی زمین.

## اجرا

1. تنه و سر رو آروم و کامل به یک طرف بچرخون و از روی شونه نگاه کن.
2. ۳ ثانیه نگه دار.
3. برگرد و طرف دیگه.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | عضلات چرخشی تنه |
| **چرا این تمرین؟** | حفظ چرخش تنه؛ برای راه رفتن، چرخیدن در تخت و نگاه کردن به پشت. |
| **کجا باید حس کنی** | کشش در کمر و پهلو. |
| **مقدار** | ۸ تا ۱۰ بار هر طرف. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کمتر. |
| **سخت‌ترش کن** | دست‌ها باز، چرخش بیشتر. |

**اشتباه‌های رایج:** بلند شدن باسن؛ حرکت سریع.

تمرین ۷۶ | سطح ۱۰ آسان | کشش و سرد کردن



# رسیدن در حالت نشسته

## شروع

لب صندلی محکم، کف پاها روی زمین؛ اول بار یک همراه کنارت باشه.

## اجرا

1. دست‌ها رو در هم کن.
2. به جلو و به دو طرف، به یک هدف برس (مثلاً لیوان روی چهارپایه).
3. به حالت صاف برگرد.
4. کم‌کم هدف رو دورتر و پایین‌تر بذار.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | تعادل نشسته، تنه |
| **چرا این تمرین؟** | تعادل نشسته؛ پایه‌ی لباس پوشیدن، برداشتن اشیا و ایستادن. |
| **کجا باید حس کنی** | کار عضلات کمر، پهلو و شکم برای حفظ تعادل. |
| **مقدار** | ۱۰ بار در هر جهت، ۲ تا ۳ بار در روز. |
| **ساده‌ترش کن** | هدف نزدیک‌تر؛ یک دست روی صندلی. |
| **سخت‌ترش کن** | هدف دورتر و نزدیک‌تر به زمین. |

**اشتباه‌های رایج:** حبس نفس؛ بلند شدن پاها از زمین؛ عجله.

تمرین ۷۷ | سطح ۲ · متوسط | قدرت



# نشستن کنار دیوار (ایزومتریک)

## شروع

پشتت رو به دیوار بده و پاها رو حدود ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر جلوتر از دیوار، به عرض لگن بذار.

## اجرا

1. پشتت رو روی دیوار پایین بکش تا زانوها حدود ۳۰ تا ۴۵ درجه خم بشن (کم‌عمق).
2. زانوها هم‌راستای انگشت دوم پا بمونن.
3. نگه دار و نفس بکش. بعد با فشار پاها بالا بیا.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | چهارسر ران |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت عضله بدون حرکت مفصل؛ اغلب در زانوی دردناک و تاندینوپاتی، درد رو موقتاً کم می‌کنه. |
| **کجا باید حس کنی** | جلوی ران. درد زانو باید کم یا بی‌تغییر باشه. |
| **مقدار** | ۳۰ تا ۴۵ ثانیه × ۴ تا ۵ ست، ۱ دقیقه استراحت بین ست‌ها. |
| **ساده‌ترش کن** | زاویه‌ی کمتر (تقریباً ایستاده) یا زمان کمتر. |
| **سخت‌ترش کن** | زاویه‌ی بیشتر (تا ۶۰ درجه) یا زمان بیشتر. |

**اشتباه‌های رایج:** رفتن زانوها جلوتر از پنجه با زاویه‌ی عمیق؛ نگه داشتن نفس؛ جمع شدن زانوها به داخل.

**احتیاط:** اگه فشار خون کنترل‌نشده داری، نفس رو نگه ندار و زمان رو کوتاه کن.

تمرین ۷۸ | سطح ۳ · پیشرفته | قدرت



# پایین اومدن آهسته از پله

## شروع

روی پله‌ی اول بایست، نرده رو بگیر.

## اجرا

1. پای آزاد رو آهسته از لبه‌ی پله به پایین ببر و با پاشنه به زمین ضربه‌ی آرومی بزن.
2. زانوی پای ایستاده هم‌راستای انگشت دوم پا بمونه.
3. با همون پای ایستاده برگرد بالا.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | چهارسر (اکسنتریک)، باسن |
| **چرا این تمرین؟** | تمرین دقیق همون مهارتی که پایین اومدن از پله رو سخت کرده. |
| **کجا باید حس کنی** | جلوی ران پای ایستاده. |
| **مقدار** | ۸ تا ۱۰ تکرار هر پا × ۲ تا ۳ ست؛ پایین رفتن در ۳ ثانیه. |
| **ساده‌ترش کن** | پله‌ی کوتاه‌تر (۵ تا ۱۰ سانتی‌متر). |
| **سخت‌ترش کن** | پله‌ی بلندتر، یا پایین رفتن ۵ ثانیه‌ای. |

**اشتباه‌های رایج:** زانوی ایستاده به داخل می‌چرخه؛ لگن پایین می‌افته؛ پایین رفتن سریع.

**احتیاط:** در درد کشککی‌رانی، ارتفاع رو طوری انتخاب کن که درد کم و قابل‌تحمل بمونه.

تمرین ۷۹ سطح ۲ · متوسط قدرت



# سُر دادن ساعد روی دیوار (دندانه‌ای)

## شروع

رو به دیوار، ساعدها روی دیوار به عرض شانه، یک حوله زیر ساعدها.

## اجرا

1. ساعدها رو به دیوار فشار بده و آهسته به بالا سُر بده.
2. کتف‌ها رو کمی از هم باز نگه دار.
3. آهسته برگرد.

| | |
|---|---|
| **عضله‌ی هدف** | دندانه‌ای قدامی، ذوزنقه‌ی پایینی |
| **چرا این تمرین؟** | تقویت چرخش بالای کتف؛ کمک به بالا بردن دست بدون درد. |
| **کجا باید حس کنی** | زیر بغل و کنار دنده‌ها. |
| **مقدار** | ۱۰ تکرار × ۳ ست. |
| **ساده‌ترش کن** | دامنه‌ی کمتر. |
| **سخت‌ترش کن** | کش حلقه‌ای دور مچ‌ها. |

**اشتباه‌های رایج:** بالا بردن شونه به سمت گوش؛ قوس کمر.

بخش ۷

# خانواده، زندگی و داستان‌ها

خانواده، کار، خونه، و داستان ثریا خانم، آقای حسینی و لیلا خانم.

فصل ۳۲

# خانواده

| بهتره | نه |
| --- | --- |
| **باور** کردن علائم | «**عصبی** شدی، آروم بگیر» |
| تحمل **راه رفتن** شبانه | ناراحتی از **بیدار** شدن |
| همراهی در **پیاده‌روی** | تعارف **قهوه** و **چای** شب |

**باور کن؛ عصبی بودن نیست.**

فصل ۳۳

# کار

| | ☐ |
|---|---|
| **جلسه‌های** طولانی: کنار در بشین تا بتونی بلند شی | |
| **ایستاده** کار کردن بخشی از روز | |
| **سفر کاری** صبح، نه شب | |

**کنار در بشین.**

فصل ۳۴

# خونه

| ☐ | |
|---|---|
| | **چراغ** شب در مسیر |
| | **کیسه‌ی** گرم و سرد |
| | **دفترچه**: ساعت علائم، کافئین، ورزش، خواب |
| | **کش** و **صندلی** برای ورزش |

**دفترچه‌ی علائم.**

فصل ۳۵

# داستان ثریا خانم: فریتین پایین

ثریا خانم **۵۸ ساله**؛ **۳ سال** شب‌ها بی‌قرار بود. آزمایش خونش «نرمال» گفته شده بود.

| زمان | چی شد |
|---|---|
| **پزشک** | **فریتین** پایین برای پاهای بی‌قرار؛ بررسی علت |
| **ماه ۱ تا ۳** | **آهن** طبق پزشک؛ روتین عصر |
| **ماه ۳** | شب‌ها **خیلی آروم‌تر** |

**«کم‌خونی نداشتم، ولی آهنم کم بود.»**

فصل ۳۶

# داستان آقای حسینی: دارو بیشتر، علائم بیشتر

آقای حسینی **۶۷ ساله**؛ چند سال داروی **دوپامینی** می‌خورد. علائم از **شب** به **بعدازظهر** رسیده بود و **دست‌هاش** هم بی‌قرار می‌شد.

| زمان | چی شد |
|---|---|
| **متخصص** | **تشدید** با داروی دوپامینی؛ تغییر دارو **آهسته** |
| **همزمان** | آهن، ورزش ۳ روز در هفته |
| **ماه ۴** | علائم فقط **شب**، و **کمتر** |

**«دارو رو خودم بیشتر می‌کردم؛ اشتباه بود.»**

فصل ۳۷

# داستان لیلا خانم: قرص سرماخوردگی شبانه

لیلا خانم **۵۱ ساله**؛ هر زمستون شب‌ها **قرص سرماخوردگی** خواب‌آور می‌خورد و پاهاش **بدتر** می‌شد.

| زمان | چی شد |
|---|---|
| **داروساز** | قرص **آنتی‌هیستامین** دار؛ جایگزین |
| **ماه ۱** | چای پررنگ عصر **نه**؛ پیاده‌روی صبح |
| **ماه ۲** | شب‌ها **راحت‌تر** |

**«یه قرص کوچیک، مقصر اصلی بود.»**

بخش ۸

# پرسش‌ها، جدول‌ها و واژه‌نامه

جواب ۵۰ سؤال رایج، جدول‌های پیگیری و معنی اصطلاحات.

فصل ۳۸

# ۵۰ سؤال رایج

## 1. پاهای بی‌قرار چیه؟

میل شدید به تکون دادن پاها، بدتر در استراحت و شب (فصل ۱).

## 2. چهار نشونه؟

فصل ۱.

## 3. تشخیص با کیه؟

پزشک (فصل ۱).

## 4. علتش چیه؟

کمبود آهن، ارث، کلیه، نوروپاتی (فصل ۲).

## 5. ارثیه؟

گاهی (فصل ۲).

## 6. کدوم قرص‌ها بدترش می‌کنن؟

آنتی‌هیستامین، بعضی ضدافسردگی‌ها و ضدتهوع‌ها (فصل ۳).

### 7. قهوه؟

ممکنه بدترش کنه (فصل ۳ و ۱۹).

### 8. الکل؟

بدترش می‌کنه (فصل ۳ و ۱۹).

### 9. درمانش چیه؟

آهن، دارو با پزشک، ورزش (فصل ۴).

### 10. گاباپنتین؟

از داروهای اصلی؛ با پزشک (فصل ۴ و ۸).

### 11. پرامی‌پکسول؟

برای بیشتر بیماران توصیه نمی‌شه (فصل ۴ و ۱۰).

### 12. با گرفتگی عضله فرق داره؟

گرفتگی سفت شدن دردناکه؛ فصل ۵.

### 13. با لخته فرق داره؟

لخته ورم و درد یک ساقه؛ همون روز پزشک (فصل ۵).

### 14. تنگی شریان پا؟

درد ساق با راه رفتن که با ایستادن بهتر می‌شه (فصل ۵).

### 15. عصبیه؟

نه؛ بیماری عصبی واقعیه (فصل ۶).

### 16. آهنم نرماله.

فریتین رو بپرس (فصل ۶ و ۹).

### 17. ورزش بدترش می‌کنه؟

متوسط نه؛ شدید و دیروقت گاهی (فصل ۶ و ۱۲).

### 18. قرص خواب؟

بعضی‌ها بدترش می‌کنن (فصل ۶).

### 19. ورزش چقدر کمک می‌کنه؟

۱۲ هفته ورزش، علائم رو کم کرد (فصل ۷).

### 20. کدوم ورزش؟

هوازی و قدرت پا، ۳ روز در هفته (فصل ۷).

## 21. رهنمود جدید چی می‌گه؟

آهن اول؛ دوپامینی نه برای بیشتر بیماران (فصل ۸).

## 22. آهن تزریقی؟

توصیه‌ی قوی در کمبود آهن (فصل ۸).

## 23. فریتین چیه؟

ذخیره‌ی آهن بدن (فصل ۹).

## 24. آهن رو با چی بخورم؟

با ویتامین C، نه با چای (فصل ۹ و ۲۲).

## 25. آهن خودسرانه؟

نه (فصل ۹).

## 26. تشدید چیه؟

بدتر شدن با داروی دوپامینی در طول زمان (فصل ۱۰).

## 27. دوز رو بیشتر کنم؟

نه؛ با پزشک (فصل ۱۰).

### 28. روتین عصر؟

پیاده‌روی آروم، کشش، تنفس (فصل ۱۱).

### 29. کی ورزش کنم؟

صبح یا عصر زود (فصل ۱۲).

### 30. ورزش قدرتی؟

صندلی، پل، پنجه، پله (فصل ۱۳).

### 31. کشش؟

ساق، پشت ران، جلوی ران (فصل ۱۴).

### 32. شب بی‌قرار شدم.

بلند شو، راه برو، کشش (فصل ۱۵).

### 33. گرم یا سرد؟

امتحان کن (فصل ۱۵ و ۲۱).

### 34. تعادل؟

کم‌خوابی تعادل رو کم می‌کنه (فصل ۱۶).

## 35. کی بهتر می‌شم؟

ورزش: ۶ تا ۱۲ هفته؛ آهن: ۲ تا ۳ ماه (فصل ۱۷).

## 36. خواب؟

ساعت ثابت؛ کم‌خوابی بدترش می‌کنه (فصل ۱۸).

## 37. کافئین رو قطع کنم؟

یک هفته امتحان کن (فصل ۱۹).

## 38. سینما و هواپیما؟

صندلی کنار راهرو، پمپ مچ (فصل ۲۰).

## 39. پتوی سنگین؟

گاهی بدترش می‌کنه (فصل ۲۱).

## 40. نوروپاتی دارم؛ کیسه‌ی گرم؟

با احتیاط (فصل ۲۱).

## 41. غذاهای آهن‌دار؟

گوشت، مرغ، ماهی، عدس، لوبیا (فصل ۲۲).

## 42. چای با غذا؟

یک ساعت بعد (فصل ۲۲).

## 43. دیالیز می‌کنم.

شایع‌تره؛ با تیم دیالیز (فصل ۲۳).

## 44. دیابت دارم.

نوروپاتی شبیهشه؛ پزشک (فصل ۲۳).

## 45. از کجا شروع کنم؟

فاز ۱: آزمایش آهن و مرور داروها (فصل ۲۵).

## 46. ده دقیقه وقت دارم.

برنامه‌ی ۱۰ دقیقه‌ای (فصل ۲۹).

## 47. شب بد؟

فصل ۳۱.

## 48. کم‌خونی ندارم ولی بی‌قرارم.

داستان ثریا خانم (فصل ۳۵).

## 49. داروم بدترش کرده.

داستان آقای حسینی (فصل ۳۶).

## 50. قرص سرماخوردگی شبانه.

داستان لیلا خانم (فصل ۳۷).

فصل ۳۹

# جدول‌های پیگیری

## جدول ۱: تمرین روزانه

| هفته | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه‌شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه و جمعه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## جدول ۲: عددهای من

| شاخص | شروع | ماه ۱ | ماه ۲ | ماه ۳ | ماه ۴ | ماه ۶ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شدت علائم از ۱۰ | | | | | | |
| شب‌های بی‌قرار در هفته | | | | | | |
| ساعت خواب | | | | | | |
| ساعت شروع علائم | | | | | | |
| فنجون قهوه و چای پررنگ | | | | | | |
| روز ورزش در هفته | | | | | | |

## جدول ۳: هفته‌ی من

| روز | ورزش | روتین عصر | کافئین | ساعت علائم | خواب | شدت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## جدول ۴: پیشرفت ماهانه

| ماه | شب‌های بی‌قرار | دقیقه ورزش | کافئین | خواب | شدت | حس کلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## یادداشت‌های من

فصل ۴۰

# واژه‌نامه

| اصطلاح | معنی |
|---|---|
| سندرم پاهای بی‌قرار | میل شدید به تکون دادن پاها، بدتر در استراحت و شب |
| فریتین | ذخیره‌ی آهن بدن در آزمایش خون |
| درصد اشباع ترانسفرین | یکی از شاخص‌های آهن خون |
| داروی دوپامینی | پرامی‌پکسول، روپینیرول، روتیگوتین، لوودوپا |
| تشدید | بدتر شدن تدریجی بیماری با داروی دوپامینی |
| گاباپنتین و پرگابالین | داروهای اصلی پاهای بی‌قرار طبق رهنمود |
| آنتی‌هیستامین | داروی حساسیت و سرماخوردگی؛ بعضی‌ها خواب‌آورن |
| نوروپاتی | آسیب عصب‌های محیطی، مثلاً در دیابت |
| گرفتگی عضله | سفت شدن ناگهانی و دردناک عضله |
| AASM | آکادمی پزشکی خواب آمریکا |
| تحریک عصب | دستگاهی که عصب پایین زانو رو تحریک می‌کنه |
| روتین عصر | کشش و پیاده‌روی آروم قبل از خواب |

# منابع علمی


1. Winkelman JW, Berkowski JA, DelRosso LM, et al. Treatment of restless legs syndrome and periodic limb movement disorder: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. J Clin Sleep Med. 2025;21(1):137-152. doi:10.5664/jcsm.11390
2. Aukerman MM, Aukerman D, Bayard M, Tudiver F, Thorp L, Bailey B. Exercise and Restless Legs Syndrome: A Randomized Controlled Trial. J Am Board Fam Med. 2006;19(5):487-493. doi:10.3122/jabfm.19.5.487

# پاهای بی‌قرار

همراه قدم‌به‌قدم برای پاهای بی‌قرار.

- چهار نشونه‌ی پاهای بی‌قرار
- آهن و فریتین رو چک کن
- داروهایی که بدترش می‌کنن
- ورزش و کشش قبل از خواب
- سینما و هواپیما بدون بی‌قراری
- برنامه‌ی ۱۲ هفته‌ای

بر پایه‌ی رهنمود آکادمی پزشکی خواب آمریکا (AASM، ۲۰۲۵) و کارآزمایی ورزش در پاهای بی‌قرار (Aukerman، ۲۰۰۶).